

(卵巣がん) TC療法					
パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴	180分	Day1	21日間
カルボプラチン	AUC 6	点滴	60分	Day1	
<div><特記事項></div> <div>◎パクリタキセルはアルコール含有製剤。</div> <div>◎制吐薬として下記を内服。</div> <div>デキサメタゾン8mg分2朝食後 (Day2-4)</div>					

(卵巣がん) dose-denceTC療法					
パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴	60分	Day1、8、15	21日間
カルボプラチン	AUC 6	点滴	60分	Day1	
<div><特記事項></div> <div>◎パクリタキセルはアルコール含有製剤。</div> <div>◎制吐薬として下記を内服。</div> <div>デキサメタゾン8mg分2朝食後 (Day2-4)</div>					

(卵巣がん) BV+TC療法					
パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴	180分	Day1	21日間
カルボプラチン	AUC 6	点滴	60分	Day1	
アバスチン	15 mg/kg	点滴	※1	Day1	
<div><特記事項></div> <div>◎先発品のアバスチンを使用。</div> <div>※1 初回は90分かけて投与。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目は60分で投与可能。</div> <div>◎制吐薬として下記を内服。</div> <div>デキサメタゾン8mg分2朝食後 (Day2-4)</div>					