

イムス札幌消化器中央総合病院 乳癌レジメン(令和5年7月現在)

癌種	レジメン名	投与量	投与間隔
乳癌	CEF	EPI(60~100mg/m ² /day1)、CPA(500mg/m ² /day1)、5-FU(500mg/m ² /day1)	3週ごと
乳癌	Bmab+PTX	Bevacizumab(10mg/kg/day1,day15)、PTX(80mg/m ² /day1,8,15)	4週ごと
乳癌	DTX(3週毎)	DTX(60mg~75mg/m ² /day1)	3週ごと
乳癌	PTX(3週毎)	PTX(175mg/m ² /day1)	3週ごと
乳癌	PTX(1週毎)	PTX(80mg/m ² /day1,8,15)	4週ごと
乳癌	Eriblin	Eriblin(1.4mg/m ² /day1,8)	3週ごと
乳癌	VNR	VNR(25mg/m ² /day1,8)	3週ごと
乳癌	トラスツズマブ(3週毎)	Trastuzumab(初回8mg、2回目以降6/kg/day1)	3週ごと
乳癌	トラスツズマブ(1週毎)	Trastuzumab(初回4mg、2回目以降2mg/kg/day1)	1週ごと
乳癌	HER+PTX	Trastuzumab(初回4mg、2回目以降2mg/kg/day1,8,15,22)、PTX(80mg/m ² /day1,8,15)	4週ごと
乳癌	T-DM1	T-DM1(3.6mg/kg/day1)	3週ごと
乳癌	ペルツズマブ+HER+DTX	Pertuzumab(初回840mg、2回目以降420mg/day1)、Trastuzumab(初回8mg、2回目以降6mg/kg/day1)、DTX(75mg/m ² /day1)	3週ごと