

公開日： 2020年4月

プロトコール名	1クール	8週間
ベバシズマブ・レボホリナート・フルオロウラシル療法 (切除不能進行再発大腸癌) 外科	総クール	未定
	休薬期間	1週間

番号	薬剤名・用量 (mg/body)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	テキサート(1.65) 4A + 生食100mL	→							→							→							→							
②	ベバシズマブ(5mg/kg) + 生食100mL	→														→														
③	レボホリナート(250mg/m ²) + 5%糖液500mL	→							→							→							→							
⑤	フルオロウラシル(600mg/m ²) + 生食100mL	→							→							→							→							
⑥	生食50mL	→							→							→							→							

番号	薬剤名・用量 (mg/body)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
①	テキサート(1.65) 4A + 生食100mL	→							→							→														
②	ベバシズマブ(5mg/kg) + 生食100mL	→														→														
③	レボホリナート(250mg/m ²) + 5%糖液500mL	→							→																					
⑤	フルオロウラシル(600mg/m ²) + 生食100mL	→							→																					
⑥	生食50mL	→							→							→														