

公開日： 2020年4月

プロトコール名 TS-1・ランダ療法 (術前・切除不能進行再発 胃癌) 外科	1クール	術前 5週間	切除不能 5週間
	総クール	2	最大7
	休薬期間	2週間	2週間

番号	薬剤名・用量(mg/body)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ソルデム1 500mL								→	→	→																		
②	ソルデム1 500mL								→	→	→																		
③	ソルデム1 500mL								→	→	→																		
④	グラニセトン3mgバッグ 1袋 + デキサート(1.65) 8A								→																				
⑤	フィジオ140 500mL+メトクロプラミド(10) 1A								→	→	→																		
⑥	ランダ(60mg/m ²)+生食(total 500mL)								→																				
⑦	ソルデム3A 500mL+フロセミド(20) 1/2A								→	→	→																		
⑧	TS-1 分2	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→							
	1.25m ² 未満 80mg/日 1.25m ² 以上~1.5m ² 未満 100mg/日 1.5m ² 以上 120mg/日																												

番号	薬剤名・用量(mg/body)	29	30	31	32	33	34	35
①	ソルデム1 500mL							
②	ソルデム1 500mL							
③	ソルデム1 500mL							
④	グラニセトン3mgバッグ 1袋 + デキサート(1.65) 8A							
⑤	フィジオ140 500mL+メトクロプラミド(10) 1A							
⑥	ランダ(60mg/m ²)+生食(total 500mL)							
⑦	ソルデム3A 500mL+フロセミド(20) 1/2A							
⑧	TS-1 分2							