

公開日: 2025年1月

| | | |
|--|------|-----|
| プロトコール名 キイトルーダ・ゲムシタビン・カルホプラチン 療法(PD-L1陽性のホルモン陰性かつ HER2陰性の手術不能または再発乳癌) 外科 | 1クール | 3週間 |
| | 総クール | 未定 |
| | 休薬期間 | 1週間 |

| 番号 | 薬剤名・用量(mg/body) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ④ | 生食50mL | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | キイトルーダ(200mg/body) + 生食100mL | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | 生食50mL | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① | グラネセロン3mgパック 1袋 + テキサート(1.65) 4A | → | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | |
| ② | ゲムシタビン(1000mg/m ²) + 5%糖液 100mL | → | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | カルホプラチン(AUC2) + 生食250mL | → | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | 生食50mL | → | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ | フィルグラスチム 1A | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ | ジーラスタ 1キット | | | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | |