

公開日： 2020年4月

| | | |
|---------------------------------|------|-----|
| プロトコール名 | 1クール | 4週間 |
| フルオロウラシル・ランダ療法 (陰茎癌) 泌尿器科 | 総クール | 3 |
| | 休薬期間 | 3週間 |

| 番号 | 薬剤名・用量 (mg/body) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ① | 生食50mL | → | → | → | → | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② | フルオロウラシル(800mg/m ²) + 生食500mL | → | → | → | → | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | 生食50mL | | → | → | → | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | 生食50mL | | → | → | → | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ | フィジオ140 500mL | → | → | → | → | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | → |
| ⑥ | フィジオ140 500mL | → | → | → | → | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | → |
| ⑦ | グラニセトン3mgバッグ 1袋 + デキサート(1.65) 4A | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ | ランダ(80mg/m ²) + 生食(total500mL) | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ | ソルデム3A 500mL + メトクロプラミド(10) 1A | → | → | → | → | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | → |
| ⑩ | フィジオ140 500mL + フロセミド(20) 1/2A | → | → | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | → |

備考

⑤⑥⑨⑩はランダ day1前日にも投与する。