

公開日： 2022年10月

TIP療法(陰茎癌) 泌尿器科	1クール	3週間
	総クール	未定
	休薬期間	2週間

番号	薬剤名・用量 (mg/body)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	ソルデム3A 500mL + メイロン 20mL	→	→	→																		
②	ホ®ラミン(5) 1A + ファモチジン(20) 1A + デキサート(1.65) 4A + グラニセトロン3mg/バック 100mL	→																				
③	パクリタキセル(175mg/m ²) + 5%糖液 500mL	→																				
④	デキサート(1.65) 4A + グラニセトロン3mg/バック 100mL		→	→																		
⑤	マンニトール 150mL	→	→	→																		
⑥	ウロミテキサン(240mg/m ²) + 生食50mL (イホマイドと同時に開始 1日3回 4時間ごと)	→	→	→																		
⑦	イホマイド(1200mg/m ²) + 生食500mL	→	→	→																		
⑧	ランダ(25mg/m ²) + 生食 (total 500mL)	→	→	→																		
⑨	マンニトール 150mL	→	→	→																		
⑩	ソルデム3A 500mL + メイロン 20mL	→	→	→																		
⑪	ソルデム1 500mL	→	→	→																		