公開日: 2025年1月

フロトコール名	1クール	3调間
Pola-R-CHP療法(2日間)		+6
(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫)	総クール	木疋
内科	休薬期間	2週間

	1クール目																					
番号	薬剤名·用量(mg/body)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	アセリオ(1000)バック゚ 0.5袋	\rightarrow	\rightarrow																			
2	生食100mL+水溶性プレドニン(10) 10A +ポララミン注(5) 1A	\rightarrow	\rightarrow																			
3	生食50mL	\rightarrow																				
4	リツキシマブ(375mg/㎡) + 生食(10倍希釈)	\rightarrow																				
(5)	生食50mL	\rightarrow																				
6	ポライビー(1.8mg/kg) + 生食100mL		\rightarrow																			
7	アプレヒ [®] タントカフ $^{\circ}$ セル(125mg)		\rightarrow																			
⑦'	アプ・レヒ。タントカフ。セル(80mg)			\rightarrow	\rightarrow																	
8	パ゚ロノセトロン(0.75)バッグ50mL 1袋		\rightarrow																			
9	ドキソルビシン(50mg/m²) + 生食100mL		\rightarrow																			
10	ェント゛キサン(750mg/mឺ) + 生食100mL		\rightarrow																			
11)	生食50mL		\rightarrow																			
12	プレドニゾロン錠(100mg)			\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow																
13	ジーラスタ皮下注 3.6mg				\rightarrow																	

	2クール目以降																						
番号	薬剤名·用量(mg/body)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	アセリオ(1000)バック゛0.5袋		\rightarrow																				
2	生食100mL+水溶性プレドニン(10) 10A +ポララミン注	(5) 1A	\rightarrow																				
3	生食50mL		\rightarrow																				
4	リツキシマブ(375mg/㎡) + 生食(10倍希釈)		\rightarrow																				
5	生食50mL		\rightarrow																				
6	ポライビー(1.8mg/kg) + 生食100mL		\rightarrow																				
7	アプレピッタントカフ。セル(125mg)		\rightarrow																				
⑦'	アプレヒ [®] タントカフ $^{\circ}$ セル(80 mg)			\rightarrow	\rightarrow																		
8	パロノセトロン(0.75)バック˙50mL 1袋		\rightarrow																				
9	ドキソルビシン(50mg/m²) + 生食100m	L	\rightarrow																				
10	エント゛キサン(750mg/m²) + 生食100mL		\rightarrow																				
11)	生食50mL		\rightarrow																				
12	プレドニゾロン錠(100mg)	·		\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow																
13	ジーラスタ皮下注 3.6mg				\rightarrow																		