

公開日: 2024年5月

| | | |
|----------------------------------|------|-----|
| プロトコル名 | 1クール | 4週間 |
| IRIS療法 (切除不能進行再発大腸癌) 消化器内科 | 総クール | 未定 |
| | 休薬期間 | 2週間 |

| 番号 | 薬剤名・用量(mg/body) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| ① | デキサート(1.65) 4A + パロノセトロン(0.75)バッグ 1袋 | → | | | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | イリリテカン(100mg/m ²) + 5%糖液500mL | → | | | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | 生食50mL | → | | | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | TS-1 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.25m ² 未満 80mg/日 1.25m ² 以上~1.5m ² 未満 100mg/日 1.5m ² 以上 120mg/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |