公開日：　2026年11月

プロトコール名		
EP療法（神経内分泌癌） 消化器科	1クール	4週間
	総クール	未定
	休薬期間	1週間

番号	薬剤名・用量（mg/body）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ソルデム3A　500mL	→																											
②	ソルデム1　500mL	→																											
③	マンニットール　300mL	→																											
③’	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ0.75mgﾊﾞｯｸﾞ　1袋　+　ﾃﾞｷｻｰﾄ（1.65）　4A	→																											
④	ランダ（80mg/㎡）　+　生食　（total 500mL）	→																											
⑤	マンニットール　300mL	→																											
⑥	生食50mL	→																											
⑦	ベプシド（100mg/㎡）　+　生食 500mL	→																											
⑧	ソルデム3A　500mL	→																											
⑨	ソルデム1　500mL	→																											
⑩	生食　100mL　+　ﾃﾞｷｻｰﾄ（1.65）　4A		→	→																									
⑪	ベプシド（100mg/㎡）　+　生食 500mL		→	→																									
⑫	生食50mL		→	→																									
⑬	ジーラスタ皮下注　3.6mg				→																								

春日部中央総合病院　化学療法委員会