

【概要】

1. 新規採用薬 : スピール膏 / コルスバ
外来限定採用 : ラピフォートワイブ / アクロマイシン V / コムクロシャンプー
臨時採用(患者限定) : トレリーフ
2. 供給
3. 採用変更
4. 添付文書改訂
5. 添付資料

1. 新規採用

①院内採用

皮膚軟化剤

スピール膏 M 74.2 円/25 cm² 1 枚

【診療科名】 皮膚科

【組成】 本品は絆創膏基剤にサリチル酸 50%を含有する。1m²にサリチル酸 357gを含有する。

【効能効果】 疣贅、鶏眼、胼胝腫の角質剥離

【用法用量】 本剤を患部大(患部と同じ大きさ)に切って貼付し、移動しないように固定する。2～5 日目ごとに取りかえる。

透析室限定 : 静注透析そう痒症改善剤

コルスバ静注透析用シリンジ 17.5 μg 2971 円/筒

コルスバ静注透析用シリンジ 25.0 μg 3609 円/筒

【診療科名】 腎臓内科

【効能効果】 血液透析患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)

【用法用量】 週 3 回、透析終了時の返血時に透析回路静脈側に注入する。

②外来患者限定採用

原発性腋窩多汗症治療剤

ラピフォートワイブ 2.5% 256.1 円/包

【診療科名】 皮膚科

【組成】 1 包(薬液 2.5g)中 グリコピロニウムトシル酸塩水和物 62.5mg

【効能効果】 原発性腋窩多汗症

テトラサイクリン塩酸塩カプセル

アクロマイシン V カプセル 250 mg 10.1 円/カプセル

【診療科名】 皮膚科

【組成】 1 カプセル中 テトラサイクリン塩酸塩(日局) 250mg(力価)

外用合成副腎皮質ホルモン剤

コムクロシャンプー0.05% 20.00 円/0.03% 1g

【診療科名】 皮膚科

【組成】 1g 中 日局クロベタゾールプロピオン酸エステル 0.5mg

【効能効果】 頭部の疾患:尋常性乾癬、湿疹・皮膚炎

③臨時採用(患者限定)

パーキンソン病治療薬・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬(レボドパ賦活剤)

トレリーフ OD 錠25mg 684.1 円/錠

【診療科名】 神経内科

【組成】 1 錠中日局ゾニサミド 25mg

【効能効果】

○パーキンソン病(レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得られなかった場合)

○レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム(レボドパ含有製剤を使用してもパーキンソニズムが残存する場合)

2. 供給

●出荷調整

- ・MR ワクチン :2024 年1月自主回収に伴う出荷調整
- ・エリスロシンドライシロップ :供給停止から再開に伴う限定出荷
- ・ジェブタナ点滴静注 60 mg :6 月より供給再開に伴う限定出荷
- ・ポララミン錠 2 mg :他社影響に伴う需要過多により割り当て供給

●販売中止

該当なし

3. 採用変更 ※①-③:在庫消尽次第切り替え ④:在庫消尽次第終了

①内服

【後発から後発へ変更】

・ピオグリタゾン錠 15 mg「サンド」 → 「武田テバ」

②注射

・エルカトニン注 40 単位「武田テバ」(231 円/菅) → エルシトニン注 40 単位(426 円/菅)

:経過措置に伴い先発へ

・グルタチオン注射用 200 mg「タイヨ-」(57 円/菅) → タチオン注射用 200 mg(129 円/菅)

:経過措置に伴い先発へ

【後発から後発へ変更】

・ニコランジル点滴静注用 48mg「サワイ」 → 「日医工」

③外用

【後発から後発へ変更】

・ジクロフェナクNaゲル 1%「NIG」 → 「日本臓器」

④院内採用終了 (在庫消尽次第採用終了)

・グリメサゾン軟膏 :年間使用なし、皮膚科許可あり

・ジフルブレナードクリーム 0.05%「イワキ」 :年間使用なし、皮膚科許可あり (※軟膏は採用継続)

・スチックゼノール A :ジクロフェナク Na ゲル 1%で対応可能、皮膚科許可あり

・ピレチア錠(25 mg) :年間使用なし、神経内科許可あり

・プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「JG」 :年間使用なし、神経内科許可あり

・プロゲステンデポー筋注 125 mg :期限切れ破棄あり、経過措置のため採用終了 婦人科許可あり

・リンデロン-V クリーム 0.12% :複数剤形あり、皮膚科許可あり

4. 添付文書改訂

オキシコドン徐放錠 5mg,10mg,20mg,40mgNX「第一三共」

オキノーム散 2.5mg,5mg,10mg,20mg

モルヒネ塩酸塩注射液 10mg,50mg,200mg「シオノギ」

●11.2 その他の副作用 追加

頻度不明 痛覚過敏(増量により痛みが増悪する)、アロディニア

モルヒネ塩酸塩注射液 10mg,50mg,200mg「シオノギ」

●11.1 重大な副作用

11.1.5 麻痺性イレウス(頻度不明)、中毒性巨大結腸(頻度不明)

炎症性腸疾患の患者に投与した場合、中毒性巨大結腸があらわれるとの報告がある。

アモキシシリンカプセル 125mg,250mg「トーワ」

オーグメンチン配合錠 125SS,250RS

●11.1 重大な副作用 追加

11.1.3 薬剤により誘発される胃腸炎症候群(頻度不明)

投与から数時間以内の反復性嘔吐を主症状とし、下痢、嗜眠、顔面蒼白、低血圧、腹痛、好中球増加等を伴う、食物蛋白誘発性胃腸炎に類似したアレルギー性の胃腸炎(Drug-induced enterocolitis syndrome)があらわれることがある。主に小児で報告されている。(2.1、8.2、9.1.1 参照)

オーグメンチン配合錠 125SS,250RS

10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
メトレキサート	メトレキサートのクリアランスが減少するおそれがある。	メトレキサートの尿細管分泌が阻害され、体内からの消失が遅延し、メトレキサートの毒性が増強する可能性がある。

イグザレルト細粒分包 10mg,15mg,錠 2.5mg,10mg,15mg,OD 錠 10mg,15mg,ドライシロップ小児用 51.7mg,103.4mg (一般名:リバーロキサバン)

●2.禁忌 ポサコナゾール(ノクサフィル) 追加

アクチバシン注 600万,1200万,2400万 (一般名:アルテプラザーゼ)

●10.2 併用注意

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
レカネマブ	左記薬剤投与中に脳出血を発現した場合、出血を助長するおそれがある。	左記薬剤の副作用として脳出血の報告がある。併用により本剤が出血を助長する可能性がある。

5. 添付資料

院内採用薬の供給停止・出荷調整薬について(2024年5月21日更新)

医療安全情報 No.210 「加温加湿器との併用による人工鼻の閉塞」

DSU No.326

レブラミド内服時の避妊教育徹底のお願い

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン及び乾燥弱毒生麻しんワクチンの供給について