

【概要】

1. 新規採用薬 : ジーラスタボディポッド(診療科追加) / 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
外来限定採用
臨時採用(患者限定)
2. 供給
3. 採用変更
4. 添付文書改訂
5. 添付資料

1. 新規採用

①院内採用

持続型 G-CSF 製剤

ジーラスタ皮下注 3.6mg ボディーポッド 93832 円/キット

【診療科名】 乳腺外科

【組成】ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え) 3.6mg

【効能効果】 がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制

【用法用量】成人にはがん化学療法剤投与終了後の翌日以降、ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)として、3.6mg を化学療法 1 サイクルあたり 1 回皮下投与する。

→血液内科のみの採用でしたが、乳腺外科も追加とします

寄生性皮膚疾患剤

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 43.1 円/10% 10g

【診療科名】 皮膚科

【組成】 1g 中 サリチル酸 100mg

【効能効果】

乾癬、白癬(頭部浅在性白癬、小水疱性斑状白癬、汗疱状白癬、頑癬)、癬風、紅色粧糠疹、紅色陰癬、角化症(尋常性魚鱗癬、先天性魚鱗癬、毛孔性苔癬、先天性手掌足底角化症(腫)、ダリエー病、遠山連圈状粧糠疹)、湿疹(角化を伴う)、口囲皮膚炎、掌蹠膿疱症、ヘブラ粧糠疹、アトピー性皮膚炎、ざ瘡、せつ、腋臭症、多汗症、その他角化性の皮膚疾患。

【用法用量】 成人 1 日 1~2 回塗布する。

②外来患者限定採用

超速効型インスリンアナログ注射液

ノボラピッド注ペンフィル 1007 円/300 単位 1 筒

【診療科名】 糖尿病内科

【組成】 日局 インスリン アスパルト(遺伝子組換え) 300 単位

【効能効果】 インスリン療法が適応となる糖尿病

持効型溶解インスリンアナログ注射液

レベミル注ペンフィル 1219 円/300 単位 1 筒

【診療科名】 糖尿病内科

【組成】 インスリン デテムル(遺伝子組換え) 300 単位

【効能効果】 インスリン療法が適応となる糖尿病

がん性皮膚潰瘍臭改善薬 酒さ治療薬

ロゼックスゲル 0.75% 97.5 円/0.75%1g

【診療科名】 皮膚科

【組成】 1g 中 日局 ムロニダゾール 7.5mg

【効能効果】 がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減 酒さ

持続性 GIP/GLP-1 受容体作動薬

マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス 1924 円/2.5 mg 0.5ml1 キット

マンジャロ皮下注 5mg アテオス 3848 円/5 mg 0.5ml1 キット

【診療科名】 循環器内科

【組成】 チルゼパチド

【効能効果】 2 型糖尿病

経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

ハルロピテープ 8mg 312.90 円/枚

【診療科名】 神経内科

【組成】 ロピニロール塩酸塩

【効能効果】 パーキンソン病

重症筋無力症治療剤

マイテラーゼ錠 10mg 13.90 円/錠

【診療科名】 神経内科

【組成】 1 錠中アンベノニウム塩化物(日局) 10mg

【効能効果】 重症筋無力症

点鼻用血管収縮剤

コールタイジン点鼻液 7.90 円/ 1mL

【診療科名】 呼吸器内科

【組成】 1mL 中、塩酸テトラヒドロゾリン 1.0mg、プレドニゾン 0.2mg

【効能効果】 諸種疾患による鼻充血・うっ血

③臨時採用(患者限定)

クラシエ加味逍遙散エキス顆粒

【診療科名】 血液内科

クレナフィン爪外用液 10%

【診療科名】 皮膚科

ピリスコピン点滴静注 50

【診療科名】 外科

2. 供給

●出荷調整

- ・イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg/100 mg「SUN」：2024 年 7 月より出荷停止
- ・アナペイン注 2 mg/ml・7.5mg/ml：製造委託先変更にも会う製造遅延が発生
- ・眼・耳科用リンデロン A 軟膏：他社製品影響に伴う供給不安定
- ・セフゾンカプセル 100 mg：他社製品影響に伴う出荷調整(B-③)
- ・セファレキシム錠 25 mg：他社製品影響に伴う限定出荷
- ・TJ-54 ツムラ抑肝散：限定出荷(解除予定 6 月中)
- ・TJ-126 ツムラ麻子仁丸：限定出荷(解除予定 6 月中)
- ・キシロカイン点眼液 4%：製造ラインにおいて逸脱が発生、原因調査のため生産を一時停止。現在は製造再開しているが在庫些少のため限定出荷。
- ・生食注シリンジ「テルモ」5ml(先端形状:スリップ)：出荷停止
- ・ナファモスタット注射用 10 mg「SW」：安定供給に支障あり、在庫消尽次第供給一時停止。

●販売中止

- ・プロスコープ 370 注:メーカー都合によるもの

3. 採用変更 ※①-③:在庫消尽次第切り替え ④:在庫消尽次第終了

①内服

- ・バップフォー錠 10(28 円/錠) → プロピペリン塩酸塩錠 10 mg「杏林」(12.7 円/錠)
- ・メグルコ錠 250 mg(10.1 円/錠) → メホルミン塩酸塩錠 250 mg MT「トーワ」(10.1 円/錠)

【後発→後発の変更】

- ・ロスバスタチン OD 錠 2.5 mg「日医工」 → 「フェルゼン」
- ・酢酸亜鉛錠 25 mg「サワイ」 → 「ノーベル」
- ・ピオグリタゾン錠 15 mg「サワイ」 → 「武田テバ」

②注射

- ・ブリディオ静注 200 mg (9000 円/瓶) → スガマデクス静注液 200mg「VTRS」(2897 円/瓶)
- ・プロスコープ 370 注 100ml (3002 円/瓶) → イオプロミド 370 注 100ml「BYL」(4370 円/瓶)：販売中止に伴う採用変更

③外用

【後発→後発の変更】

- ・ブロムフェナク Na 点眼液 0.1%「日新」 → 「日点」

④院内採用終了 (在庫消尽次第採用終了)

- ・リンデロンVGクリーム 0.12%：皮膚科確認済

4. 添付文書改訂

キイトルーダ点滴静注 100mg (一般名:ペムプロリズマブ)

- 4. 効能又は効果 追加
 - ・治癒切除不能な進行・再発の胃癌
 - ・治癒切除不能な胆道癌

レベチラセタム錠 250mg,500mg,ドライシロップ 50%,点滴静注 500mg「日新」(商品名:イーケプラ)

- 9. 特定の背景を有する患者に関する注意 追記
 - 9.5.2 本剤を投与した妊婦から出生した児において、新生児薬物離脱症候群があらわれることがある。

フルオロウラシル注 250mg,1000mg「トローワ」(商品名:5-FU)

- 11.1 重大な副作用
 - 11.1.13 意識障害を伴う高アンモニア血症(頻度不明)
 - 高アンモニア血症が発症した患者において、乳酸アシドーシスを併発したとの報告がある。

ペンタサ顆粒 94%,錠 250mg,500mg (一般名:メサラジン)

- 14. 適用上の注意
 - 14.2 薬剤投与後の注意
 - 14.2.2 メサラジン又はその代謝物を含む尿は、次亜塩素酸塩を含有する漂白剤と接触することにより赤褐色に変色することがある。

5. 添付資料

院内採用薬の供給停止・出荷調整薬について(2024年6月25日更新)
医薬品・医療機器等安全性情報 No.410