

【概要】

1. 新規採用薬 : 申請なし  
外来限定採用 : リフヌア錠  
臨時採用(患者限定)
2. 供給
3. 採用変更
4. 添付文書改訂
5. 添付資料

1. 新規採用

①院内採用

申請なし

②外来患者限定採用

咳嗽治療薬

リフヌア錠 45mg 187.40 円/錠

【診療科名】 呼吸器内科

【有効成分】 ゲーフアピキサントクエン酸塩

③臨時採用(患者限定使用)

エクフィナ錠 50mg 867.9 円/錠

【診療科名】 血液内科

【有効成分】 サフィナミド

レプロジル皮下注用 25 mg 184552 円/瓶 75mg 551000 円/瓶

【診療科名】 血液内科

【有効成分】 ルスパテルセプト

デュロキセチン錠 30 mg 38.5 円/錠

【診療科名】 血液内科

ソランタール錠 100 mg 10.1 円/錠

【診療科名】 泌尿器科

【有効成分】 チアラミド

バリキサ錠 450 mg 2223.9 円/錠

【診療科名】 血液内科

【有効成分】 バルガンシクロビル

## 2. 供給

### ●出荷調整

- ・ヒアレイン点眼 0.1%「科研」：自社事情に伴う出荷調整
- ・インスリン リスプロBS 注「サノフィ」：需要増加に伴う出荷調整、新規処方を控えていただく
- ・デュロテップ MT パッチ各種：安定性試験上の問題による出荷遅延、在庫消尽次第一時出荷停止予定

### ●販売中止

- ・マックメット懸濁用配合 DS：在庫消尽次第販売中止

## 3. 採用変更 ※①-③:在庫消尽次第切り替え ④:在庫消尽次第終了

### ①内服

- ・フリバス錠 25 mg(21.4 円/錠) → ナフトピジル錠 25 mg「杏林」(10.1 円/錠)

### ②注射

[外来採用]

- ・プレベナー13 水性懸濁注 → プレベナー20 水性懸濁注

### ③外用

該当なし

### ④院内採用終了（在庫消尽次第採用終了）

該当なし

## 4. 添付文書改訂

ツルバダ配合錠（一般名：エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩）

### ●4.効能又は効果 追加

HIV-1 感染症の曝露前予防

### ●25.保険給付上の注意

本剤は HIV-1 感染症の治療目的で使用した場合にのみ保険給付される。

キイトルーダ点滴静注 100mg（一般名：ペムプロリズマブ）

### ●4.効能又は効果 追加

非小細胞肺癌における術前・術後補助療法

タリージェ錠 2.5mg,5mg,10mg,15mg,OD 錠 2.5mg,5mg,10mg,15mg（一般名：ミロガバリンベシル酸塩）

### ●11.1 重大な副作用 追加

11.1.3 腎機能障害(頻度不明)

パルモディア錠 0.1mg,XR 錠 0.2mg,0.4mg（一般名：ペマフィブラート）

### ● 11.1 重大な副作用

11.1.2 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)

バルプロ酸ナトリウム細粒 20%,40%「EMEC」

●10.2 併用注意

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
フェニトイン ホスフェニトイン フェノバルビタール (8.2、11.1.2 参照)	バルプロ酸による高アンモニア血症のリスクが増加するとの報告がある。	機序は不明である。

●15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.2 本剤との因果関係は明らかではないが、北欧で実施された観察研究において、受胎前の 3 ヶ月間に本剤に曝露した父親の児は、ラモトリギン又はレベチラセタムに曝露した父親の児と比較して、神経発達症リスクの増加を示唆する報告がある(調整ハザード比 1.50[95%信頼区間 1.09-2.07])。一方で、てんかんを有する父親を対象とした海外で実施された観察研究において、受胎前の 120 日間に本剤に曝露した父親の児は、本剤に曝露していない父親の児と比較して、統計学的に有意な神経発達症リスクの増加は認められないとする報告もある。

5. 添付資料

院内採用薬の供給停止・出荷調整薬について(2024 年 9 月 17 日更新)

医療安全情報 No.214 「開放式の三方活栓の誤った取り扱い」

DSU No.329