

【概要】

1. 新規採用薬 : 申請なし
外来限定採用 : ドパコール配合錠 L50 / メマンチン錠 20 mg / インフリーS / レボセチリジン
グルコンサン K / 治打撲一方 / 桂枝加朮附湯 / 排膿散及湯
臨時採用(患者限定)
2. 供給
3. 採用変更
4. 添付文書改訂
5. 添付資料

1. 新規採用

①院内採用

申請なし

②外来患者限定採用

パーキンソニズム治療剤

ドパコール配合錠 L50 5.90 円/錠

【組成】 1 錠中 レボドパ(日局)50mg カルビドパ水和物(日局)5.4mg(無水物として 5mg)

【効能効果】 パーキンソン病、パーキンソン症候群

NMDA 受容体拮抗アルツハイマー型認知症治療剤

メマンチン塩酸塩錠 20mg「DSEP」 74.5 円/錠

【組成】 メマンチン塩酸塩 20mg

【効能効果】 中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

組織活性型鎮痛・抗炎症剤

インフリーS カプセル 200mg 20.6 円/カプセル

【組成】 インドメタシン ファルネシル 200mg

【効能効果】 下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛

関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群

持続性選択 H1 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

レボセチリジンシロップ 6.70 円/mL

【組成】 1mL 中レボセチリジン塩酸塩 0.5mg

カリウム補給剤

グルコンサン K 錠 2.5mEq 5.9 円/錠

【組成】 1 錠中 カリウム 2.5mEq 相当量 (グルコン酸カリウム 585mg)

【効能効果】 低カリウム状態時のカリウム補給。

ツムラ治打撲一方エキス顆粒 8.3 円/g

【組成】 日局ケイヒ 3.0g/日局センキュウ 3.0g/日局センコツ 3.0g/日局ボクソク 3.0g/日局カンゾウ
1.5g/日局ダイオウ 1.0g/日局チョウジ 1.0g

【効能効果】 打撲によるはれ及び痛み

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 14.9 円/g

【組成】 日局ケイヒ 4.0g/日局シャクヤク 4.0g/日局ソウジュツ 4.0g/日局タイソウ 4.0g/日局カンゾウ 2.0g/日局ショウキョウ 1.0g/日局ブシ末 0.5g

【効能効果】 関節痛、神経痛

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 13.4 円/g

【組成】 日局キキョウ 4.0g/日局カンゾウ 3.0g/日局キジツ 3.0g/日局シャクヤク 3.0g/日局タイソウ 3.0g/日局ショウキョウ 1.0g

③臨時採用(患者限定使用)

ユベラ軟膏 2.5 円/g

【有効成分】 トコフェロール ビタミン A

イクスタンジ錠 80 mg 2116.0 円/錠

【有効成分】 エンザルタミド

2. 供給

●出荷調整

- ・ソル・コーテフ注射用 100 mg(ファイザー) : 製造ラインの問題に伴う出荷停止
- ・ソル・コーテフ静注用 250 mg(ファイザー)
: ソル・コーテフ 100 mg 代替に伴う需要増加、定量規格の問題発生による限定出荷
- ・ソル・コーテフ静注用 500 mg(ファイザー): ソル・コーテフ 100 mg、250 mg の代替需要増加に伴う限定出荷
- ・ジスロマック点滴静注用 500 mg(ファイザー) : 製造ラインの問題に伴う出荷停止
- ・ブイフェンド 200 mg(ファイザー) : 製造ラインの問題に伴う限定出荷
- ・キシロカインゼリー2% : 製造工程の逸脱発生による製造遅延のため限定出荷

●販売中止

該当なし

3. 採用変更 ※①-③:在庫消尽次第切り替え ④:在庫消尽次第終了

①内服

該当なし

②注射

[後発薬品から後発薬品への変更]

- ・ベバシズマブ BS 点滴静注 100 mg「ファイザー」 → 「CTNK」 : ファイザー社出荷調整に伴う採用変更
- ・ベバシズマブ BS 点滴静注 400 mg「ファイザー」 → 「CTNK」 : ファイザー社出荷調整に伴う採用変更
- ・テルモ糖注 50%200ml → 大塚糖液 50%200ml
- ・ダルベポエチンアルファ BS 注射液 10 μg シリンジ「MYL」 → 「三和」
- ・ダルベポエチンアルファ BS 注射液 20 μg シリンジ「MYL」 → 「三和」
- ・ダルベポエチンアルファ BS 注射液 30 μg シリンジ「MYL」 → 「三和」
- ・ダルベポエチンアルファ BS 注射液 40 μg シリンジ「MYL」 → 「三和」
- ・ダルベポエチンアルファ BS 注射液 60 μg シリンジ「MYL」 → 「三和」
- ・ダルベポエチンアルファ BS 注射液 120 μg シリンジ「MYL」 → 「三和」
- ・ドブタミン持続静注 150 mg シリンジ「KKC」 → 「テルモ」 : 販売移管に伴う屋号変更(12 月以降販売予定)

③外用

- ・ルリコンクリーム 1%(30.3 円/g) → ルリコナゾールクリーム 1%「イワキ」(17.3 円/g)
- ・カロナール坐剤 200(31.4 円/個) → アセトアミノフェン坐剤 200「日新」(20.3 円/個)

[外来採用]

- ・ロゼックス 50g/個 →15g/本 :皮膚科医による変更依頼
- ・ドボベットゲル 30g/個 →15g/本 :皮膚科医による変更依頼

④院内採用終了（在庫消尽次第採用終了）

該当なし

4. 添付文書改訂

レキサルティ錠 1mg,2mg,OD 錠 0.5mg,1mg,2mg（一般名:ブレクスピプラゾール）

● 4.効能又は効果/用法及び用量 追加

アルツハイマー型認知症に伴う焦燥感、易刺激性、興奮に起因する、過活動又は攻撃的言動

1日1回0.5mgから投与を開始した後、1週間以上の間隔をあけて増量し、1日1回1mgを経口投与する。なお、忍容性に問題がなく、十分な効果が認められない場合に限り、1日1回2mgに増量することができるが、増量は1週間以上の間隔をあけて行うこと。

COX 阻害作用を含む薬剤

●9.特定の背景を有する患者に関する注意 9.5 妊婦 追記

シクロオキシゲナーゼ阻害剤を妊娠中期以降の妊婦に使用し、胎児の動脈管収縮が起きたとの報告があり、また妊娠後期はその発現リスクがより高くなることが知られている。

アムロジピン錠 2.5mg,5mg,10mg,OD 錠 2.5mg,5mg,10mg「VTRS」

● 9.特定の背景を有する患者に関する注意 追記

9.1.2 心不全のある患者

非虚血性心筋症による重度心不全患者注)を対象とした海外臨床試験において、プラセボ群と比較して本剤投与群で肺水腫の発現頻度が高かったとの報告がある。

注)本剤の承認された効能又は効果は「高血圧症」及び「狭心症」である。

5. 添付資料

院内採用薬の供給停止・出荷調整薬について(2024年10月22日更新)

医療安全情報 No.215 「食事中止時のインスリン投与による低血糖」

医薬品・医療機器等安全性情報 No.413

DSU No.330

ソル・コーテフ注射用 100 mgの供給に関するお詫びとお願い(2024年10月/ファイザー)