

【概要】

1. 新規採用薬 :ビリスコピン / パントシン散
外来限定採用 :オゼンピック / ベージニオ / トルカプ / レキサルティ OD 錠 0.5 mg
ジクトルテープ / ハイゼントラ / モイゼルト軟膏
2. 供給
3. 採用変更
4. 添付文書改訂
5. 添付資料

1. 新規採用

①院内採用

点滴静注胆のう・胆管造影剤

ビリスコピン点滴静注 50 8854 円/瓶

【組成】 1mL 中日局イオトロクス酸 79.83mg、メグルミン 25.63mg 含有

【禁忌】

- 1 ヨード又はヨード造影剤に過敏症の既往歴のある患者[8.1 参照]
- 2 重篤な甲状腺疾患のある患者[ヨード過剰に対する自己調節メカニズムが機能できず、症状が悪化するおそれがある。][9.1.13 参照]

【効能効果】 胆のう・胆管撮影

【用法用量】 100mL を 30~60 分にわたり点滴静注する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

パントテン酸系製剤

パントシン散 20% 11.1 円/g

【組成】 1g 中パンテチン(日局)注)250mg(パンテチンとして 200mg)

【効能効果】

- (1)パントテン酸欠乏症の予防及び治療
- (2)パントテン酸の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給
(消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊娠婦、授乳婦など)
- (3)下記疾患のうち、パントテン酸の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合
・高脂血症 ・弛緩性便秘 ・ストレプトマイシン及びカナマイシンによる副作用の予防及び治療
・急・慢性湿疹 ・血液疾患の血小板数ならびに出血傾向の改善

なお、(3)の適応に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。

【用法用量】 1 日 30~180mg、血液疾患、弛緩性便秘には 1 日 300~600mg を 1~3 回に分けて経口投与する。高脂血症には 1 日 600mg を 3 回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

②外来患者限定採用

【患者限定】 2 型糖尿病治療剤 持続性 GLP-1 受容体作動薬

オゼンピック皮下注 2mg 11151 円/キット

【組成】 1 筒(1.5mL) 有効成分 セマグルチド(遺伝子組換え) 2.01mg

【効能効果】 2 型糖尿病

【ブルーレター有】 抗悪性腫瘍剤

ベージニオ錠 50mg	3049.7 円/錠
ベージニオ錠 100mg	5567.7 円/錠
ベージニオ錠 150mg	7917.5 円/錠

【組成】 アベマシクリブとして 50mg、100mg、150mg

【効能効果】

- ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌
- ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法

抗悪性腫瘍剤(AKT 阻害剤)

トルカプ錠 160mg	11116.2 円/錠
トルカプ錠 200 mg	13493.2 円/錠

【組成】 1錠中カピバセルチブ 160mg、200 mg

【効能効果】 内分泌療法後に増悪したPIK3CA、AKT1 又は PTEN 遺伝子変異を有するホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌

【用法用量】 フルベストラントとの併用において、通常、成人にはカピバセルチブとして 1回 400mg を 1日 2回、4日間連続して経口投与、その後 3日間休薬。これを 1サイクルとして投与を繰り返す。適宜減量。

抗精神病薬

レキサルティ OD 錠 0.5mg	128.7 円/錠
-------------------	-----------

【組成】 1錠中 ブレクスピプラゾール 0.5mg

【効能効果】

- 統合失調症
- うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る)
- アルツハイマー型認知症に伴う焦燥感、易刺激性、興奮に起因する、過活動又は攻撃的言動

経皮吸収型 持続性疼痛治療剤

ジタルテープ 75mg	154.5 円/枚
-------------	-----------

【組成】 1枚中 日局ジクロフェナクナトリウム 75mg

【効能効果】

- 各種がんにおける鎮痛
- 腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎

血漿分画製剤(皮下注用人免疫グロブリン製剤)

ハイゼントラ 20%皮下注 4g／20mL	40,166 円/瓶
-----------------------	------------

【組成】 人免疫グロブリン G 4,000mg

【禁忌】 高プロリン血症 1型又は 2型の患者[本剤に含有されるプロリンが通常の代謝経路では代謝されないため、血中プロリン濃度が高値になり、症状があらわれることがある。]

【効能効果】

- 無又は低ガンマグロブリン血症
- 慢性炎症性脱髓性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制(筋力低下の改善が認められた場合)

アトピー性皮膚炎治療剤

モイゼルト軟膏 1%	146.30 円/g
------------	------------

【組成】 1g 中ジファミラスト 10mg

【効能効果】 アトピー性皮膚炎

2. 供給

●販売中止

- ・ボビドショードゲル 10%「VTRS」 ※2026年3月31日経過措置満了
- ・スponゼル 2025年9月販売中止時期 ※2026年3月31日経過措置満了

●販売移管

- ・ハイドレアカプセル 500mg クリニジエン株式会社からチェプラファーム株式会社へ (2025年7月1日~)

3. 採用変更 ※①-③:在庫消尽次第切り替え ④:在庫消尽次第終了

①内服

- ・セレスタミン配合錠 (8.0円/錠) → エンペラシン配合錠(6.1円/錠) :包装単位の影響による採用変更
- ・パントシン錠 100 (6.7円/錠) → パントシン散 20% (11.1円/g)

②注射

該当なし

③外用

- ・ボビドショードゲル 10%「VTRS」(32.7円/10g) → ポピヨドングル 10%(35円/10g)

④院内採用終了 (在庫消尽次第採用終了)

- ・メピバカイン塩酸塩注射液 0.5%シリンジ 50mg/10mL「NP」(153円/本) :ペイン外来終了のため
- ・ネオビタカイン注シリンジ 5mL(343円/本) :ペイン外来終了のため
- ・ウルティプロ吸入用カプセル(160.6円/Cap) :2年間使用頻度少ないとため
- ・オンプレス吸入用カプセル 150μg(125.4円/Cap) :2年間使用頻度少ないとため
- ・テオフィリンドライシロップ 20%「タカタ」(50.1円/g) :2年間院内使用極少、期限切れのため

4. 添付文書改訂

ベネクレクスタ錠 10mg,50mg,100mg (一般名:ベネトクラクス)

●4. 効能又は効果 追加

再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫

リツキサン点滴静注 100mg,500mg (一般名:リツキシマブ)

●4. 効能又は効果 追加

頻回再発型あるいはステロイド依存性のネフローゼ症候群

エリキュース錠 2.5mg,5mg (一般名:アピキサバン)

●5. 効能又は効果に関連する注意 追記

<アミバンタマブ(遺伝子組換え)とラゼルチニブとの併用投与による静脈血栓塞栓症の発症抑制>
5.3 アミバンタマブ(遺伝子組換え)及びラゼルチニブの電子添文を参照すること。

イクスタンジ錠 40mg,80mg (一般名:エンザルタミド)

●2. 禁忌 追加

ニルマトレルビル・リトナビルを投与中の患者

ポライバー点滴静注用 30mg,140mg (一般名:ポラツズマブ ベドチン)

●9.4 生殖能を有する者

9.4.1 妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び最終投与後 9 カ月間において避妊する必要性及び適切な避妊法について説明すること。(9.5 参照)

9.4.2 男性には、本剤投与中及び最終投与後 6 カ月間においてバリア法(コンドーム)を用いて避妊する必要性について説明すること。(15.2 参照)

5. 添付資料

院内採用薬の供給停止・出荷調整薬について(2025 年 4 月 30 日更新)

医療安全情報 No.221 「カリウム製剤の投与方法間違い (第 2 報)」

医薬品・医療機器等安全性情報 No.418

DSU No.335