

【概要】

1. 新規採用薬 : 該当なし  
外来限定採用 : ミネプロ / アジョビ皮下注オートインジェクター
2. 供給
3. 採用変更
4. 添付文書改訂
5. 添付資料

1. 新規採用

①院内採用 該当なし

②外来患者限定採用

選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー

ミネプロ OD 錠 2.5mg 91.60 円/錠

ミネプロ OD 錠 5mg 137.40 円/錠

【組成】 1錠中エサキセレノン 2.5mg、5 mg

【効能効果】 高血圧症

ヒト化抗 CGRP モノクローナル抗体製剤

アジョビ皮下注 225mg オートインジェクター 39,064 円/1 キット

【組成】 フレマネズマブ(遺伝子組換え) 225mg

【効能効果】 片頭痛発作の発症抑制

【用法用量】 4週間に1回の投与から12週間に1回の投与、又は12週間に1回の投与から4週間に1回の投与に変更する場合、変更後の初回投与は、変更前の次回投与予定日に行うこと。

【重要な基本的注意】 8.3 自己投与は4週間に1回 225mg 投与の場合のみとする

2. 供給

●出荷調整

- ・(院外採用)メノエイドコンビパッチ : 製剤フィルムの一部剥離発生、対象ロット回収・出荷停止
- ・ソル・コーテフ静注用 250 mg : 出荷量減少→出荷量通常
- ・ソル・コーテフ注射用 100 mg : 出荷停止→出荷量減少
- ・フロセミド注 20 mg「トーワ」 : アンプル製剤製造ラインの一時的な稼働停止の影響により在庫消尽次第出荷一時停止
- ・バクトラミン注 : 海外製造所における製造遅延のため限定出荷

●販売終了

・インフリキシマブ BS 点滴静注用 100mg「CTH」

3. 採用変更 ※①-③:在庫消尽次第切り替え ④:在庫消尽次第終了 ⑤:マスタ閉鎖

①内服

・イグザレルト OD 錠 10mg(331.6 円/錠) → リバーコキサバン OD 錠 10mg「日医工」(161.3 円/錠)

・イグザレルト OD 錠 15mg(442.3 円/錠) → リバーコキサバン OD 錠 15mg「日医工」(226.7 円/錠)

※リバーコキサバン適応: 非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制のみ

・ラゲブリオカプセル 200mg (2,164.9 円/Cap) → ラゲブリオ錠 400mg (4,329.8 円/錠)

[後発品→後発品の変更]

- ・ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25 mg「サワイ」 → 「TCK」
- ・カペシタピン錠 300 mg「日医工」 → 「サワイ」
- ・ドンペリドン錠 10mg「日医工」 → 「サワイ」 :販売中止に伴う変更
- ・(院外) カリジノゲナーゼ錠 25 単位「トーワ」 → 「サワイ」 :経過措置に伴う変更
- ・(院外) リザトリプタン OD 錠 10mg「アメル」 → 「VTRS」 :経過措置に伴う変更
- ・(院外) リン酸コデイン散 1%「日医工」 → 「フソー」 :経過措置に伴う変更
- ・(院外) レトロゾール錠 2.5 mg「日医工」 → 「サンド」 :経過措置に伴う変更

②注射

[後発品→後発品の変更]

- ・20%ブドウ糖注射液「ニッシン」20ml(100 円/菅) → ブドウ糖注 20%PL「Hp」20ml(100 円/菅)
- ・フロセミド注 20 mg「トーワ」 → 「NIG」 :出荷停止による変更

③外用 該当なし

④院内採用終了 (在庫消尽次第採用終了)

- ・ロゼウス静注用 10mg(2172 円/瓶) :乳腺外科のみでの使用のため
- ・ロゼウス静注用 40mg(8014 円/瓶) :乳腺外科のみでの使用のため
- ・ザルチロン注 :外来患者のみに使用、薬剤販売終了のため採用終了、処方医確認済
- ・インフリキシマブ BS 点滴静注用 100 mg「CTH」 :近年使用なし、消化器内科・外科確認済

⑤院外採用終了 経過措置・院外使用なしのためマスタ閉鎖

- ・クレメジンカプセル 200 mg :2025/3/31 経過措置
- ・コデインリン酸塩散 1%「タケダ」 :2025/3/31 経過措置
- ・タベンタ錠 25mg :2025/3/31 経過措置
- ・タベンタ錠 50mg :2025/3/31 経過措置
- ・ビベスピエアロスフィア 28 吸入 :2025/3/31 経過措置
- ・フラビタン点眼液 0.05% :2023/3/31 経過措置

4. 添付文書改訂

キイトルーダ点滴静注 100mg

●11.1 重大な副作用 追加

11.1.20 血管炎(0.2%)

大型血管炎、中型血管炎、小型血管炎[抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎、IgA 血管炎を含む]があらわれることがある。

バベンチオ点滴静注 200mg

●8.重要な基本的注意 下線部追加

8.3 肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。(11.1.3 参照)

5. 添付資料

院内採用薬の供給停止・出荷調整薬について(2025 年 8 月 日更新)

医療安全情報 No.225 「「既読」の画像診断報告書の重要所見への未対応」

医薬品・医療機器等安全性情報 No.421

DSU No.338