

【概要】

- 新規採用薬 : エンレスト錠 200 mg / ジオン注生食液付
外来限定採用 : アゼラスチン錠 / ビルタサ散 / オテズラ錠
臨時採用(患者限定)
- 供給
- 採用変更
- 添付文書改訂
- 添付資料

1. 新規採用

①院内採用

アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)

エンレスト錠 200mg 188.2 円/錠

内痔核硬化療法剤

ジオン注生食液付 4,592 円/瓶

【組成】 日局 硫酸アルミニウムカリウム水和物 400mg(4w/v%) タンニン酸 14mg(0.14w/v%)

【禁忌】妊娠又は妊娠している可能性のある女性[9.5 参照]

授乳中の女性[9.6 参照]

透析療法を受けている患者[9.2.1 参照]

嵌頓痔核を伴う患者[症状を悪化させることがある。]

次の部位には投与しないこと

直腸下部の粘膜下以外の部位[壊死等の症状があらわれることがある。]

【効能効果】脱出を伴う内痔核

【用法用量】本剤の投与に先立ち、腰椎麻酔あるいは仙骨硬膜外麻酔により肛門括約筋を弛緩させる。

用時、ジオン注生食液付 1 バイアル(10mL)に添付の生理食塩液 10mL を加えて 20mL とし、硫酸アルミニウムカリウム水和物として 2% 溶液に調製する。成人には、1 つの主痔核あたり 2% 溶液として 9~13mL を分割して粘膜下に投与。なお、投与量は患者の病態により適宜増減することとし、1 回の治療あたりの総投与量は 2% 溶液として 60mL 以内とする。

→ジオン注無痛化剤付(元々の採用)は用事発注とします。

②外来患者限定採用

アレルギー性疾患治療剤

アゼラスチン塩酸塩錠 1 mg 6.1 円/錠

【組成】 日局 アゼラスチン塩酸塩 1mg

【効能効果】○気管支喘息 ○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、アトピー性皮膚炎、皮膚うっ痒症、痒疹

高カリウム血症改善剤

ビルタサ懸濁用散分包 8.4g 949.50 円/8.4g 1 包

【組成】 1 包中パチロマーソルビテクスカルシウムをパチロマーとして 8.4g 含有

【禁忌】 腸閉塞の患者

【効能効果】 高カリウム血症

PDE4 阻害剤

オテズラ錠 30mg 989.60 円/錠

【組成】 アプレミラスト 30mg

【禁忌】 妊婦又は妊娠している可能性のある女性

【効能効果】

○局所療法で効果不十分な尋常性乾癬

○乾癬性関節炎

○局所療法で効果不十分な掌蹠膿疱症

○局所療法で効果不十分なベーチェット病による口腔潰瘍

【用法用量】 成人にはアプレミラストとして以下のとおり経口投与し、6日目以降はアプレミラストとして1回30mgを1日2回、朝夕に経口投与する。

1日目	2日目		3日目		4日目		5日目		6日目以降	
朝	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
10mg	10mg	10mg	10mg	20mg	20mg	20mg	20mg	30mg	30mg	30mg

2. 供給

●出荷調整

・リンデロン注 2 mg :生産量が追い付かず限定出荷

・水溶性プレドニン 10mg :生産量が追い付かず限定出荷

3. 採用変更 ※①-③:在庫消尽次第切り替え ④:在庫消尽次第終了 ⑤:マスタ閉鎖

①内服

[後発品→後発品への変更]

・レナリドミドカプセル 2.5 mg「VTRS」→「F」

・レナリドミドカプセル 5 mg「VTRS」→「F」

②注射

該当なし

③外用

・クレナフィン爪外用液 10% 3.56g(1396.8 円/g) → エフィナコナゾール爪外用液 10%「科研」(676.3 円/g)

④院内採用終了 (在庫消尽次第採用終了)

・ペラニンデポー筋注 5mg :2026/3/31 経過措置、使用患者なし

・フェントステープ 8 mg :期限切れ破棄薬あり、使用患者なし

⑤院外採用終了 ※経過措置薬品は経過措置日にマスタ閉鎖

・コデインリン酸塩散 1%「フソー」 :製造販売中止のため。2026年4月経過措置品移行予定

4. 添付文書改訂

ボルテゾミブ注射用 3mg「DSEP」

●4.効能又は効果 マントル細胞リンパ腫 適応追加

5. 添付資料

医療安全情報 No.228 「粉碎調製された持参薬の過量与薬」

DSU No.340

医薬品・医療機器等安全性情報 No.424

1 :医薬品副作用被害救済制度の概要と 制度への協力のお願いについて

2 :在宅酸素療法中の火災事故について

3 :妊娠中の解熱鎮痛薬の服用に関する 情報提供について

CTCAE ver6

供給不安定・出荷調整薬(2025年11月25日更新)