

レジメン名	診療科
TS-1+GEM	外科

適応疾患
胆道がん 切除不能・進行再発肺癌

1クール	21日
総クール	可能な限り
休薬期間	7日

薬剤名(一般名)	投与量(mg/m ²)	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
ゲムシタビン	1000mg/m ²	d1、d8

内服併用薬	投与量(mg/m ²)	用法	投与日(d1~d5、d1、d8等)
TS-1	※60~100mg/日	1日2回	d1~14

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量(mg/m ²)	投与方法	投与速度	投与日 (d1~5等)
①	グラニセトロン3mgバッグ100mL	DIV	30分	d1、d8
②	ゲムシタビン1000mg/m ² + Ns100mL※	DIV	30分	d1、d8
③	Ns50mL(フラッシュ用)	DIV	15分	d1、d8
④				

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

※TS-1の投与量

体表面積	初回基準量	服用方法
1.25m ² 未満	60mg/日	朝40mg、夕20mg
1.25m ² 以上~1.5m ² 未満	80mg/日	朝40mg、夕40mg
1.5m ² 以上	100mg/日	朝50mg、夕50mg

※血管痛出現時はゲムシタビンの溶解液を5%糖液100mLに変更する場合あり