

| | |
|-------|-----|
| レジメン名 | 診療科 |
| XELOX | 外科 |

| |
|---------------|
| 適応疾患 |
| 進行・再発・切除不能大腸癌 |

| | |
|------|------|
| 1クール | 21日 |
| 総クール | PDまで |
| 休薬期間 | 6日 |

| | | | |
|----------|-------------------------|-----|-------------------|
| 薬剤名(一般名) | 投与量(mg/m ²) | 投与日 | (d1~d5、d1、d8等で記入) |
| オキサリプラチン | 130mg/m ² | | d1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------------------------|------|---------------------|
| 内服併用薬 | 投与量(mg/m ²) | 用法 | 投与日(d1~d5, d1, d8等) |
| カペシタビン | 1000mg/m ² /回 | 1日2回 | d1夕~d15朝 |
| | | | |

処方 (輸液・プレマジ・ポストマジを含む)

| 番号 | 薬剤名・用量(mg/m ²) | 投与方法 | 投与速度 | 投与日(d1~5等) |
|----|---|------|------|------------|
| ① | グラニセトロン3mgバッグ100mL+デキサート8mg +ネオレスタール10mg | DIV | 30分 | d1 |
| ② | エルプラット130mg/m ² +5%糖液250mL | DIV | 2時間 | d1 |
| ③ | Ns50mL(フラッシュ用) | DIV | 全開 | d1 |
| ④ | | | | |

備考 (減量・中止の基準を記載してください)