

|         |     |
|---------|-----|
| レジメン名   | 診療科 |
| Bev+S0X | 外科  |

|      |     |
|------|-----|
| 適応疾患 | 大腸癌 |
|------|-----|

|      |      |
|------|------|
| 1クール | 21日間 |
| 総クール |      |
| 休薬期間 | 6日   |

| 薬剤名(一般名) | 投与量(mg/m <sup>2</sup> ) | 投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入) |
|----------|-------------------------|-----------------------|
| ベバシズマブ   | 7.5mg/kg                | d1                    |
| オキサリプラチン | 130mg/m <sup>2</sup>    | d1                    |
|          |                         |                       |
|          |                         |                       |

| 内服併用薬 | 投与量(1日量)   | 用法     | 投与日(d1~d5, d1, d8等) |
|-------|------------|--------|---------------------|
| TS-1  | 80-120mg/日 | 分2朝夕食後 | d1夕~d15朝            |

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

| 番号 | 薬剤名・用量(mg/m <sup>2</sup> )              | 投与方法 | 投与速度                            | 投与日(d1~5等) |
|----|---|------|---------------------------------|------------|
| ①  | ベバシズマブ 7.5mg/kg+Ns 100mL                | DIV  | 初回90分<br>2回目60分<br>3回目以降<br>30分 | d1         |
| ②  | グラニセトロン3mgバッグ100mL+デキサート8mg             | DIV  | 30分                             | d1         |
| ③  | オキサリプラチン130mg/m <sup>2</sup> +5%糖液250mL | DIV  | 2時間                             | d1         |
| ④  | 生食50mL(フラッシュ用)                          | DIV  | 全開                              | d1         |
| ⑤  |   |      |                                 |            |
| ⑥  |   |      |                                 |            |

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

※TS-1の投与量

| 体表面積                                       | 初回基準量   | 服用方法        |
|--|---------|-------------|
| 1.25m <sup>2</sup> 未満                      | 80mg/日  | 朝40mg、夕40mg |
| 1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満 | 100mg/日 | 朝50mg、夕50mg |
| 1.5m <sup>2</sup> 以上                       | 120mg/日 | 朝60mg、夕60mg |