

レジメン名	診療科
GCS療法	外科

適応疾患
切除不能胆道癌

1クール	14日
総クール	24週間
休薬期間	7日

薬剤名(一般名)	投与量(mg/m ²)	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
ゲムシタビン	1,000mg/m ²	d1
シスプラチン	25mg/m ²	d1

内服併用薬	投与量(mg/m ²)	用法	投与日(d1~d5, d1, d8等)
アプレピタント	125mg	③投与60分前	d1
アプレピタント	80mg	朝食後	d2~3
TS-1	40~60mg/回	朝夕食後	d1~7

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量(mg/m ²)	投与方法	投与速度	投与日
①	ソルデム3A500mL+硫酸Mg20mL	DIV	90分	d1
②	パロセトロン0.75mg+デキサト8mg+Ns50mL	DIV	30分	d1
③	シスプラチン25mg/m ² +Ns500mL	DIV	120分	d1
④	ゲムシタビン1000mg/m ² +5%糖液100mL	DIV	30分	d1
⑤	Ns50mL(フラッシュ用)	DIV	15分	d1
⑥	ラクテック500ml+フロセミド20mg	DIV	60分	d1
⑦	ラクテック500ml	DIV	60分	d1
⑧				

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

減量基準	内容	TS-1	GEM	CDDP
TS-1に関連する下痢・口内炎・悪心・疲労	Grade3	1段階減量		
GEMに関連する好中球減少症、血小板減少	Grade4		1段階減量	
GEMに関連するFN、非血液毒性	Grade3			
CDDPに関連する神経障害、聴覚障害	Grade2以上			休薬

	TS-1			GEM	CDDP
体表面積	1.25未満	1.25以上1.5未満	1.5以上		
初回投与量	80	100	120	1000	25
1段階減量	60	80	100	800	休薬
2段階減量	50	60	80	600	
3段階減量	中止			20%減量	