

レジメン名	診療科
GC療法 ショート ハイドレーション	外科

適応疾患
切除不能 胆道癌

1クール	21日
総クール	CDDP最大16回まで
休薬期間	13日

薬剤名(一般名)	投与量(mg/m <sup>2</sup> )	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	d1、d8
ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	d1、d8

内服併用薬	投与量(mg/m <sup>2</sup> )	用法	投与日(d1~d5、d1、d8等)
アプレピタント	125mg	①投与開始時	d1、d8
アプレピタント	80mg	朝食後	d2-3、d9-10

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量(mg/m <sup>2</sup> )	投与方法	投与速度	投与日(d1~5等)
①	硫酸Mg8mL+ソルデム3A500mL	DIV	1時間	d1、d8
②	パロノセトロン0.75mg+デキサート9.9mg+生食100mL	DIV	30分	d1、d8
③	シスプラチン25mg/m <sup>2</sup> +生食500mL	DIV	1時間	d1、d8
④	ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup> +5%糖液100mL	DIV	30分	d1、d8
⑤	ラクテック500mL	DIV	1時間	d1、d8
⑥	経口補水液 500mL	p.o		d1、d8
⑦				
⑧				

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

腎機能 : Cr ≤ 1.2mg/dL, Ccr ≥ 50mL/minの患者が対象

【開始基準】

WBC ≥ 3000、好中球 ≥ 1500、血小板 ≥ 10万、AST ≤ 150、ALT ≤ 150、T-Bil ≤ 3.0

Cr ≤ 1.2、皮疹Grade0、感染Grade0

【減量方法】

GEM 1000mg/m<sup>2</sup> → 800mg/m<sup>2</sup> → 600/m<sup>2</sup> → 中止

CDDP 25mg/m<sup>2</sup> → 中止

