

レジメン名	診療科
G-SOX	外科

適応疾患	1クール	21日間
切除不能進行・再発胃癌	総クール	
	休薬期間	6日

1クール	21日間
総クール	
休薬期間	6日

薬剤名(一般名)	投与量(mg/m ²)	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
オキサリプラチン	100mg/m ²	d1

内服併用薬	投与量(1日量)	用法	投与日(d1~d5、d1、d8等)
TS-1	80-120mg/日	分2朝夕食後	d1夕~d15朝

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量(mg/m ²)	投与方法	投与速度	投与日 (d1~5等)
①	グラニセトロン3mgバッグ100mL+デキサート8mg	DIV	30分	d1
②	オキサリプラチン100mg/m ² +5%糖液250mL	DIV	2時間	d1
③	生食50mL(フラッシュ用)	DIV	全開	d1
④				
⑤				

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

※TS-1の投与量

体表面積	初回基準量	服用方法
1.25m ² 未満	80mg/日	朝40mg、夕40mg
1.25m ² 以上~1.5m ² 未満	100mg/日	朝50mg、夕50mg
1.5m ² 以上	120mg/日	朝60mg、夕60mg