

レジメン名 <b>GC療法 (泌尿器)</b>	診療科 <b>泌尿器科</b>
--------------------------------	--------------------

適応疾患 <b>尿路上皮癌</b>
----------------------

1クール	<b>28日</b>
総クール	4クール
休薬期間	<b>13日</b>

薬剤名	投与量(mg/m <sup>2</sup> )	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
ゲムシタビン	1,000mg/m <sup>2</sup>	d1、d8、d15
シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	d2

内服併用薬	投与量(mg/m <sup>2</sup> )	用法	投与日(d1~d5、d1、d8等)
アプレピタント	125mg	1×⑦'投与60分前	d2
アプレピタント	80mg	1×M	d3~4

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

**GC療法1枚目**

番号	薬剤名・用量(mg/m <sup>2</sup> )	投与方法	投与速度	投与日(d1~5等)
①	グラニセトロン3mg	DIV	30min	d1、d8、d15
②	ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup> +5%Tz100mL	DIV	30min	d1、d8、d15
③	5%Tz 50mL(フラッシュ用)	DIV	15min	d1、d8、d15
④	ソルデム3A 500ml	DIV	4hr	d1
⑤	ソルデム3A 500ml	DIV	4hr	d1
⑥	ソルデム3A 500ml	DIV	4hr	d1

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

(※)の使用は主治医の判断による

WBC2000未満

Plt 7万未満 は延期

eGFR 60mL/min以上	全量投与
eGFR 40~60mL/min	75%に減量
eGFR 40mL/min以下	CDDP投与を見合わせる