

レジメン名 <b>GEM/CBDCA</b> (泌尿器)	診療科 <b>泌尿器科</b>
------------------------------------	--------------------

適応疾患 <b>膀胱がん</b>
---------------------

1クール	28日
総クール	PDまで
休薬期間	13日

薬剤名	投与量 (mg/m <sup>2</sup> )	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	d1、d8、d15
カルボプラチン	AUC5	d2

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量 (mg/body)	投与方法	投与速度	投与日 (d1~5等)
①	グラニセトロンバッグ3mg	DIV	30min	d1、d8、d15
②	ゲムシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> )+5%糖液100ml	DIV	30min	d1、d8、d15
③	5%糖液50mL(フラッシュ用)	DIV	15min	d1、d8、d15
④	グラニセトロンバッグ3mg+デキサート8mg	DIV	30min	d2
⑤	カルボプラチン(AUC5)+生食500ml	DIV	2hr	d2
⑥	生食50ml(フラッシュ用)	DIV	15min	d2

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

推定GFR60ml/min以下の患者への使用に限る

●カルボプラチン投与量はCalvertの式により算出する。

《算出方法》

Calvertの式: 投与量=AUC目標値×(25+GFR(ml/min))

カルボプラチン投与量=5×(25+ ml/min)= mg/body