

レジメン名	診療科
A+AVD	血液内科

適応疾患
ホジキンリンパ腫

1クール	28日間
総クール	4~6クール (CSによる)
休薬期間	13日間

薬剤名(一般名)	投与量(mg/m ²)	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
アドセトリス	1.2mg/kg	d1、d15
ドキシソルビシン	25mg/m ²	d1、d15
ビンブラスチン	6mg/m ² (最大10mg)	d1、d15
ダカルバジン	375mg/m ²	d1、d15

内服併用薬	投与量(mg/m ²)	用法	投与日(d1~d5、d1、d8等)
アセトアミノフェン(200)2T		1×アドセトリス 30分前	d1、d15
ポララミン(2)1T			

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)				
番号	薬剤名・用量(mg/m ²)	投与方法	投与時間	投与日(d1~5等)
①	アドセトリス1.2mg/kg+NS	DIV	60分	d1、d15
②	NS 500mL	メイン DIV	100mL/hr 血管痛出現時速度 上げる	d1、d15
③	グラニセトロンバック100mL+デキサート4mg	側管 DIV	30分	d1、d15
④	ドキシソルビシン25mg/m ² +NS100mL	側管 DIV	30分	d1、d15
⑤	エクザール6mg/m ² +NS50mL	側管 DIV	5分	d1、d15
⑥	ダカルバジン375mg/m ² +NS100mL	側管 DIV	30分	d1、d15
⑦				

備考 (減量・中止の基準を記載してください)