

レジメン名	診療科
<b>ABVD</b>	<b>血液内科</b>

適応疾患
<b>ホジキンリンパ腫</b>

1クール	28日間
総クール	4~6クール (CSによる)
休薬期間	13日間

薬剤名(一般名)	投与量(mg/m <sup>2</sup> )	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
ドキシルビシン	25mg/m <sup>2</sup>	d1、d15
ブレオマイシン	10mg/m <sup>2</sup> (最大15mg)	d1、d15
ビンブラスチン	6mg/m <sup>2</sup> (最大10mg)	d1、d15
ダカルバジン	375mg/m <sup>2</sup>	d1、d15

処方		(輸液・プレメジ・ポストメジを含む)			
番号		薬剤名・用量(mg/m <sup>2</sup> )	投与方法	投与時間	投与日 (d1~5等)
①	メイン	Ns 500mL	DIV	100mL/h	d1、d15
①	側管	グラニセトロン3mg/100mL+デキサト8mg	DIV	30分	d1、d15
②	側管	ドキシルビシン25mg/m <sup>2</sup> +Ns100mL	DIV	30分	d1、d15
③	側管	ブレオ10mg/m <sup>2</sup> (最大15mg)+Ns100mL	DIV	30分	d1、d15
④	側管	エキサール6mg/m <sup>2</sup> (最大10mg)+Ns50mL	DIV	5分	d1、d15
⑤	側管	ダカルバジン375mg/m <sup>2</sup> +Ns100mL	DIV	30分	d1、d15
⑥	※投与後メインNsにて10分フラッシュ				

**備考** (減量・中止の基準を記載してください)

血管痛が現れた際には、メイン生食の滴下量を増やす