

レジメン名	診療科
V+D(皮下注)	血液内科

適応疾患
多発性骨髄腫

1クール	35日間
総クール	9コースまたは維持療法に変更まで
休薬期間	12日間

薬剤名(一般名)	投与量(mg/m ²)	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
ボルゾミブ	1.3mg/m ²	d1、d8、d15、d22

内服併用薬	投与量(mg/m ²)	用法	投与日(d1~d5、d1、d8等)
カイトリル(1mg)	2錠	ベルケイド投与30分前	d1、d8、d15、d22
レナデックス(4mg)	5錠	ベルケイド投与30分前	d1、d8、d15、d22
レナデックス(4mg)	5錠	分1朝食後	d2、d9、d16、d23

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量(mg/m ²)	投与方法	投与速度	投与日(d1~5等)
①	ベルケイド1.3mg/m ²	皮下注	—	d1、d8、d15、d22
②				

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

腎障害、80歳以上の高齢者、腸管麻痺、重度の末梢神経障害では投与間隔を週に一度に延長、投与量を1mg/m²に減量を組み合わせ調節可