

レジメン名	診療科
アドセトリス	血液内科

適応疾患
再発又は難治のCD30陽性 ホジキンリンパ腫/未分化大細胞 リンパ腫

1クール	21日
総クール	1～16サイクル
休薬期間	20日間

薬剤名(一般名)	投与量(mg/m ²)	投与日 (d1～d5、d1、d8等で記入)
ブレツキサブ ヘドチン	1.8mg/m ²	d1

内服併用薬	投与量	用法	投与日(d1～d5, d1, d8等)
コカール200mg	2錠	分1	d1 (アドセトリス投与30分前)
ポララミン2mg	1錠	分1	d1 (アドセトリス投与30分前)

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量(mg/m ²)	投与方法	投与時間	投与日 (d1～5等)
①	アドセトリス1.8mg/kg+Ns100mL～250mL(別紙参照)	DIV	1時間	d1
②	Ns 50mL(フラッシュ用)	DIV	5分	d1
③				

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

Grade3以上の好中球減少症が発現した際はGrade2以下に回復するまで休薬する。回復後は同一用量で再開する

【末梢神経障害】

Grade2,3: ベースライン又はGrade1以下に回復するまで休薬する。回復した場合は、1.2mg/kgに減量して投与を再開する。

Grade4: 投与中止する