

レジメン名	診療科
A+CHP	血液内科

適応疾患
PTCL 初発

1クール	21日間
総クール	8クール
休薬期間	16日間

薬剤名(一般名)	投与量(mg/m ²)	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
アドセトリス	1.8mg/kg	d1
エンドキサン	750mg/m ²	d1
ドキシルビシン	50mg/m ²	d1

内服併用薬	投与量(mg/m ²)	用法	投与日(d1~d5, d1, d8等)
アセトアミノフェン(200)	2T	1×アドセトリス 30分前	d1
ポララミン(2)	1T		
プレドニゾン	100mg/body	分1~分2	d1~d5

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量(mg/m ²)	投与方法	投与時間	投与日(d1~5等)
①	グラニセトロン3mgバッグ100mL	DIV	30分	d1
②	アドセトリス1.8mg/kg+NS	DIV	60分	d1
③	エンドキサン750mg/m ² +Ns250mL	DIV	60分	d1
④	ドキシソルビシン塩酸塩50mg/m ² +Ns100mL	DIV	30分	d1
⑤	Ns 50mL (フラッシュ用)	DIV	-	d1
⑥				
⑦				
⑧				

備考 (減量・中止の基準を記載してください)