

レジメン名	診療科
EPd	血液内科

適応疾患
再発又は難治性の 多発性骨髄腫

1クール	28日間
総クール	奏功中継続
休薬期間	6日間

薬剤名	投与量(mg/m <sup>2</sup> )	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
エロツズマブ	10mg/kg	1~2クール:d1, 8, 15, 22
エロツズマブ	20mg/kg	3クール目以降:d1
デキサメタゾン	40mg/body	1~2クール:d1, 8, 15, 22
ファモチジン	20mg	3クール目以降:d1

内服併用薬	投与量(mg/m <sup>2</sup> )	用法	投与日(d1~d5, d1, d8等)
ポマリドミド	4mg/body	医師の指示通り	d1-d21
デキサメタゾン	40mg/body	朝食後	3クール目以降:d8, d15, d22
アセトアミノフェン	400mg	エムプリシティ30分前	1~2クール:d1, 8, 15, 22
ポララミン	2mg		3クール目以降:d1

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量(mg/m <sup>2</sup> )	投与方法	投与時間	投与日(d1~5等)
①	デキサート40mg+ファモチジン20mg+Ns50mL	DIV	30分	1~2クール:d1, 8, 15, 22 3クール目以降:d1
②	エムプリシティ10mg/kg + 生食(対応量)	DIV	下記	1~2クール:d1, 8, 15, 22
②'	エムプリシティ20mg/kg + 生食(対応量)	DIV	下記	3クール目以降:d1
③	生食50mL(フラッシュ用)	DIV	10分	1~2クール:d1, 8, 15, 22 3クール目以降:d1

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

【エムプリシティ投与速度(10mg/kg)】

	0~30分	30~60分	60分以降
1回目投与	0.5mL/分	1mL/分	2mL/分
2回目投与	3mL/分	4mL/分	
3回目投与以降	5mL/分		

【エムプリシティ投与速度(20mg/kg)】

	0~30分	30分以降
1回目投与	3mL/分	4mL/分
2回目以降	5mL/分	