

レジメン名	診療科
ジフォルタ	血液内科

適応疾患
再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫

1クール	49日間
総クール	PDもしくは認容不能な副作用の発生まで継続
休薬期間	13日間

薬剤名	投与量(mg/m ²)	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
プララトレキサート	30mg/m ²	d1, 8, 15, 22, 29, 36

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量(mg/m ²)	投与方法	投与時間	投与日 (d1~5等)
①	ジフォルタ 30mg/m ² +Ns50mL	DIV	10分	d1, 8, 15, 22, 29, 36
②	Ns 50mL(フラッシュ用)	DIV	10分	d1, 8, 15, 22, 29, 36
③				

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

- ・ 粘膜炎：Grade1以上の場合は休薬、減量
- ・ 血小板：初回投与時は10万/ μ L以下、2回目投与時以降5万/ μ L以下で休薬、減量
- ・ 好中球：1000/ μ L以下の場合休薬、減量

※1 初回投与日の10日以上前から葉酸として1日1回1.0~1.25mgを連日経口投与する。投与終了後から30日後までは葉酸の投与を継続する

※2 初回投与日の10日以上前からビタミンB12として1回1mgを8~10週毎に筋注する。ジフォルタ投与中は投与を継続する