

レジメン名	診療科
バベンチオ	泌尿器科

適応疾患
根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 根治切除不能な尿路上皮癌における化 学療法後の維持療法

1クール	14日
総クール	PDまで
休薬期間	13日

薬剤名	投与量(mg/m <sup>2</sup> )	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
アベルマブ	10mg/kg	d1

内服併用薬	投与量(mg/m <sup>2</sup> )	用法	投与日(d1~d5、d1、d8等)
アセトアミノフェン	600mg/body	バベンチオ30分前	d1
ポララミン	2mg/body	バベンチオ30分前	d1

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量(mg/m <sup>2</sup> )	投与方法	投与速度	投与日(d1~5等)
①	バベンチオ 10mg/kg + Ns 250mL	DIV	60分	d1
②	Ns 50mL(フラッシュ用)	DIV	15分	d1
③				
④				
⑤				
⑥				
⑦				
⑧				

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

- 中止基準：・間質性肺炎：Grade3、4又は再発性のGrade2  
・肝機能障害：AST又はALTが基準値上限の5倍超、又は総Bill基準値上限の3倍超  
・大腸炎、下痢：Grade4又は再発性のGrade3  
・infusion reaction：Grade3又はGrade4  
・腎障害：Grade4 ・心筋炎