

【概要】

1. 新規採用薬： グラナテック点眼液 0.4% / エバシエルド筋注セット / ポトックス注用 50 単位
アンチレクス静注 10mg / ビベスピエアロスフィア / ビレーズトリエアロスフィア
2. 供給状況： タゾピペ / 酢酸「ヨシダ」 / エクセラール配合錠
3. 採用変更： ニトロール注 / ミルナシプラン
4. 添付文書変更
5. 添付資料

1. 新規採用

①院内採用

Rho キナーゼ阻害薬－緑内障・高眼圧症治療剤－

グラナテック点眼液 0.4% 449.5 円/0.4%1mL

【申請名】 薬剤部 DI 担当

【申請理由】

緑内障治療薬の1つであり、代替薬がない点眼剤。当院では臨時採用としていたが、近年入院患者様の使用率が高く、包装単位も 5 本/箱であるため本採用としていただきたい。

【組成】 リパスジル塩酸塩水和物

【効能効果】 次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない場合 緑内障、高眼圧症

【用法用量】 1 回 1 滴、1 日 2 回点眼する。

抗 SARS-CoV-2 モノクローナル抗体

エバシエルド筋注セット 薬価未収載

【診療科名】 循環器内科

【申請医師名】 屋形智之

【申請理由】

SARS-CoV2 に対する中和抗体薬です。ワクチン接種困難あるいは免疫抑制状態で抗体の獲得が困難な患者に使用されます。当院では血液内科の入院患者もおり、上記の状態が必要となる患者もいることが予想されるため採用の申請を致しました。

【組成】 チキサゲビマブ(遺伝子組換え)製剤/シルガビマブ(遺伝子組換え)製剤

【禁忌】 本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴のある者

【効能効果】 SARS-CoV-2 による感染症及びその発症抑制

【用法用量】

<SARS-CoV-2 による感染症>

通常、成人及び 12 歳以上かつ体重 40kg 以上の小児には、チキサゲビマブ(遺伝子組換え)及びシルガビマブ(遺伝子組換え)としてそれぞれ 300mg を併用により筋肉内注射する。

<SARS-CoV-2 による感染症の発症抑制>

通常、成人及び 12 歳以上かつ体重 40kg 以上の小児には、チキサゲビマブ(遺伝子組換え)及びシルガビマブ(遺伝子組換え)としてそれぞれ 150mg を併用により筋肉内注射する。なお、SARS-CoV-2 変異株の流行状況等に応じて、チキサゲビマブ(遺伝子組換え)及びシルガビマブ(遺伝子組換え)としてそれぞれ 300mg を併用により筋肉内注射することもできる。

②限定採用

A 型ボツリヌス毒素製剤

ボトックス注用 50 単位 35,620 円/50 単位 1 瓶

【診療科名】 眼科

【申請医師名】 関根裕美

【申請理由】 片側顔面けいれん治療のため使用予定

【組成】 A 型ボツリヌス毒素 50 単位

【禁忌】 〈効能共通〉

2.1 全身性の神経筋接合部の障害をもつ患者(重症筋無力症、ランバート・イートン症候群、筋萎縮性側索硬化症等)

2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性及び授乳婦

2.3 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者(痙攣性斜頸)

2.4 高度の呼吸機能障害のある患者(過活動膀胱、神経因性膀胱)

2.5 尿路感染症を有する患者及び導尿を日常的に実施していない尿閉を有する患者

【効能効果】 片側顔面痙攣

【用法用量】

通常、成人には A 型ボツリヌス毒素として以下の用量を痙攣筋に筋肉内注射する。痙攣筋が複数ある場合は、分割して投与する。

・初回投与の場合には合計で 10 単位を投与する。

・初回投与後 4 週間観察し、効果が不十分な場合には、さらに追加で合計 20 単位を上限として投与することができる。

・症状再発の場合には、合計で 30 単位を上限として再投与することができる。ただし、投与間隔は 8 週以上とすること。

【処方までの流れ】

処方医がセミナー受講 → 適正使用についての同意 → 製薬会社より使用に際しての情報伝達・患者様の登録 → ボトックス使用開始

【患者限定】機能検査用薬

アンチレクス静注 10mg 110 円/管

【診療科名】 神経内科

【申請医師名】 江口桂

【申請理由】 重症筋無力症の診断に必要なため。

【組成】 エドロホニウム塩化物 10mg

【院外限定】COPD 治療配合剤

ビベスピエアロスフィア 28 吸入 1677.10 円/キット

ビベスピエアロスフィア 120 吸入 6757.20 円/キット

【診療科名】 呼吸器内科

【申請医師名】 中嶋賢尚

【申請理由】 LAMA、LABA 配合剤での pMDI 製剤のため、申請します。

【組成】 グリコピロニウム臭化物／ホルモテロールフマル酸塩水和物製剤

【院外限定】COPD 治療配合剤

ビレーズトリエアロスフィア 56 吸入 4127.60 円/キット

ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入 8771.90 円/キット

【診療科名】 呼吸器内科

【申請医師名】 中嶋賢尚

【申請理由】 COPD に適応があり、pMDI 製剤のため。吸入流速が小さい患者さんに使用可能なため

【組成】 プデソニド／グリコピロニウム臭化物／ホルモテロールフマル酸塩水和物製剤

2. 供給

●出荷調整

・タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」（割り当て供給）

●販売中止

・酢酸「ヨシダ」（500ml）※20L/本 は販売継続

・エクセラゼ配合錠（円/錠）：在庫消尽次第、当院採用も中止致します

3. 採用

1) 採用変更

①内服

該当なし

②注射

・ニトロール注 5 mg（186 円/管） → 硝酸イソソルビド注 5mg/10mL「タカタ」(153 円/管)

③外用

該当なし

④採用中止

・ミルナシプラン塩酸塩錠 25mg「サワイ」（12.6 円/錠）：2021 年使用数0、院内在庫期限切れのため

4. 添付文書

* フォリルモン P 注 75,150

効能・効果 生殖補助医療における調節卵巣刺激 を追加。

* メトグルコ錠 250mg,500mg

効能・効果

多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発、多嚢胞性卵巣症候群の生殖補助医療における調節卵巣刺激
ただし、肥満、耐糖能異常、又はインスリン抵抗性のいずれかを呈する患者に限る。 を追加。

* アイリーア硝子体内注射液 40mg/mL

効能・効果 未熟児網膜症 を追加。

* キイトルーダ点滴静注 100mg

効能・効果 ホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法、進行又は再発の子宮頸癌 を追加。

*トピエース錠 4mg,8mg

効能・効果 神経因性膀胱における排尿管理 を追加。

5. 添付資料

医療安全情報 No.191「容器の取り違いによる高濃度のアドレナリンの局所注射」