

【概要】

1. 新規採用薬 : 該当なし
限定採用 : ルコナック / ダラシン / コレクチム / グラアルファ配合点眼液
2. 供給状況
3. 採用変更 : テグレトール / ボンビバ 他、後発医薬品→後発医薬品へ変更
4. 添付文書改訂
5. 添付資料

1. 新規採用

①院内採用

該当なし

②患者限定・臨時採用

【院外限定採用】爪白癬治療剤

ルコナック爪外用液 5% 816.10 円/g

【診療科名】皮膚科 【申請医師名】大森康高

【申請理由】介白癬に対し治療が必要な患者が存在するため。クレナフィン爪外用液にかぶれの既往があり使用出来ない患者が存在するため。

【組成】ルリコナゾール 50mg

【院外限定採用】外用抗生物質製剤

ダラシン Tローション 1% 27.70 円/ml

【診療科名】皮膚科 【申請医師名】大森康高

【申請理由】頭部の毛包炎に対し治療が必要な患者が存在するため。アクアチムローション外用にてかぶれの既往があり使用出来ない患者が存在するため。

【組成】克林ダマイシンリン酸エステル

【院外限定採用】外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

コレクチム軟膏 0.5% 144.90 円/g

コレクチム軟膏 0.25% 139.30 円/g

【診療科名】皮膚科 【申請医師名】大森康高

【申請理由】アトピー性皮膚炎に対し治療が必要な患者が存在するため。※0.25%は小児

【組成】デルゴシチニブ 5mg 【効能効果】アトピー性皮膚炎

【院外限定採用】外用副腎皮質ホルモン剤

アンテベートクリーム 0.05% 18.70 円/g

【診療科名】皮膚科 【申請医師名】大森康高

【申請理由】湿疹や紅斑に対し治療が必要な患者が存在するため。

【組成】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 0.5mg

【院外限定採用】緑内障・高眼圧症治療剤 Rho キナーゼ阻害薬 / $\alpha 2$ 作動薬配合剤

グラアルファ配合点眼液 515.00 円/ml

【診療科名】眼科 【申請医師名】関根裕美

【申請理由】リパスジル・ブリモニジン点眼2種使用している症例で、合剤への変更によりアドヒアランス改善が期待できる。

【組成】リパスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩

2. 供給

●出荷調整

- ・ジメチコン内用液 2%「カイゲン」：品質管理の問題で製品回収が行われたため出荷調整
- ・サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg「日医工」：出荷停止後に販売停止
- ・生食注シリンジ「テルモ」5ml：設備トラブルに伴う出荷停止
- ・ピレシン注射液 20：需要過多に伴う出荷停止（出荷再開2月予定）
- ・サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「日医工」：出荷停止

●販売中止

- ・イトブリド塩酸塩錠 50mg「タナベ」：在庫消尽後販売中止

●出荷調整解除

- ・ツムラ人參養榮湯エキス顆粒

3. 採用変更

①内服

- ・イトブリド塩酸塩錠 50mg「タナベ」 → 「サワイ」
- ・サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg「日医工」 → 「CH」
- ・サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「日医工」 → 「トーワ」（出荷停止に伴う変更）
- ・ジメチコン内用液 2%「カイゲン」 → 「ホリイ」（出荷調整に伴う変更）
- ・テグレート錠 100mg(5.9 円/錠) → カルバマゼピン錠 100mg「アメル」(5.7 円/錠)（メーカー欠品）
- ・ドンペリドン錠 10mg「EMEC」 → 「日医工」（出荷調整に伴う変更）
- ・メナテレノンカプセル 15mg「YD」 → 「日医工」（出荷調整に伴う変更）

②注射

- ・ボンビバ静注 1mgシリンジ (4227.0 円/本) → イバンドロン酸静注 1mgシリンジ「トーワ」(1947.0 円/本)

③外用

該当なし

④院内採用中止（在庫消尽次第終了）

- ・ツムラ八味地黄丸エキス顆粒

4. 添付文書改訂（下線部：変更箇所）

*イマチニブ錠 100mg「KN」（先発：グリベック）

●重大な副作用（頻度不明）追加

天疱瘡：天疱瘡があらわれることがあるので、水疱、びらん、痂皮等が認められた場合には、皮膚科医と相談すること。

*セルトラリン錠 25mg,50mg,100mg,OD 錠 25mg,50mg「アメル」(先発:ジェイゾロフト)

●併用注意 追加

ペチジン塩酸塩含有製剤/タペンタドール塩酸塩/デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物含有製剤/フエンタニル含有製剤

臨床症状:セロトニン作用が増強されるおそれがある。

機序:これらの薬剤はセロトニン作用を有する。

スルピリン水和物 本剤の血漿中濃度が低下し、有効性が減弱するおそれがある。併用により CYP2B6 及び CYP3A4 が誘導され、本剤の代謝が促進されるためと考えられる。

*ニフェジピン CR 錠 10mg,20mg,40mg「NP」(先発:アダラート)

●禁忌 変更

削除 2.妊婦(妊娠 20 週未満)又は妊娠している可能性のある婦人

*レトロゾール錠 2.5mg「日医工」(先発:フェマール)

●禁忌 追加

<生殖補助医療における調節卵巣刺激、多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発、原因不明不妊における排卵誘発>4.活動性の血栓塞栓性疾患の患者〔症状が悪化するおそれがある。〕

●効能又は効果/用法用量 追加

- ・生殖補助医療における調節卵巣刺激
- ・多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発
- ・原因不明不妊における排卵誘発

通常、レトロゾールとして 1 日 1 回 2.5mg を月経周期 3 日目から 5 日間経口投与する。

十分な効果が得られない場合は、次周期以降の 1 回投与量を 5mg に増量できる。

5. 添付資料

院内採用薬の供給停止・出荷調整薬について(2023 年 2 月 27 日更新)

医療安全情報 No.195 「照合の未実施による誤った患者への検査・処置」

医薬品・医療機器等安全性情報 No.398

DSU No.315