

【概要】

1. 新規採用薬 : 該当なし
外来限定採用 : セファドール
臨時採用(患者限定) : 該当なし
2. 供給状況
3. 採用変更 : ジソピラミド / レキサルティ
他、後発医薬品→後発医薬品へ変更する薬剤・院内採用中止薬は各論へ
4. 添付文書改訂
5. 添付資料

1. 新規採用

①院内採用

該当なし

②外来患者限定採用

抗めまい剤

セファドール錠 25 mg 8.4 円/錠

【診療科名】 糖尿病内科 【申請医師名】 竹宮聖一

【申請理由】 「末梢性めまい」に対し、メリスロン効果なく、セファドール効果あったため

【組成】 ジフェニドール塩酸塩 25mg

【効能効果】 内耳障害にもとづくめまい

③臨時採用(患者限定)

該当なし

2. 供給

●出荷調整

- ・イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg「サワイ」 : 自社都合
- ・ネグミンシュガー軟膏(ヴィアトリス) : 他社製品の供給制限の影響により需要増加のため、限定出荷
- ・ユナシン錠 375mg (ファイザー)
- ・ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」 : 自社都合

●販売中止

- ・ジソピラミドカプセル 100mg「ファイザー」(14.1 円/錠) →徐放錠製剤へ採用変更
- ・レキサルティ錠 1 mg(245.5 円/錠) →OD 錠へ採用変更

3. 採用変更

①内服

・ジソピラミドカプセル 100mg「ファイザー」(14.1 円/Cap) → ジソピラミドリン酸塩徐放錠 150mg「トーワ」(12.4 円/錠)

・レキサルティ錠 1 mg(245.5 円/錠) → レキサルティ OD 錠 1 mg(245.5 円/錠)

【後発メーカー変更】

・アルファカルシドール錠 0.25 μ g「アメル」(5.9 円/錠) → 「BMD」(5.9 円/Cap)

・アルファカルシドール錠 0.5 μ g「アメル」(5.9 円/錠) → 「BMD」(5.9 円/Cap)

・アロプリノール錠 100 mg「サワイ」(7.8 円/錠) → 「杏林」(7.8 円/錠)

・クラリスロマイシン錠 200 mg「NPI」(22.8 円/錠) → 「サワイ」(19.2 円/錠)

・セレコキシブ錠 100 mg「日新」(11.9 円/錠) → 「ニプロ」(7.3 円/錠)

・セルトラリン錠 25 mg「TCK」(11.4 円/錠) → 「JG」(11.4 円/錠)

・タケロリムスカプセル 0.5 mg「VTRS」(99.2 円/Cap) → 「あゆみ」(99.2 円/錠)

・プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「アメル」(11.6 円/錠) → 「JG」(10.7 円/錠)

②注射

・アスパラカリウム注 10mEq (60 円/菅) → KCL注20mEqキット「テルモ」(158 円/菅)

・アミノフィリン静注 250 mg「トーワ」(94.0 円/菅) → ネオフィリン注 250 mg(94.0 円/菅)

・グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg100ml「HK」(1373 円/袋) → 「アイロム」(864 円/袋)

・レペタン注 0.2mg(118 円/菅) → プレノルフィン注 0.2mg「日新」(72 円/菅)

【後発メーカー変更】

該当なし

③外用

【後発メーカー変更】

・ブロムフェナク Na 点眼液 0.1%「日新」(36.0 円/ml) → 「日点」(36.0 円/ml)

④院内採用中止（臨時採用薬へ変更）

・エルシトニン注 20S (189 円/菅) : 使用実績なし

・フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」(10.1 円/錠) : 期限切れのため

・フレカイノド酢酸塩錠50mg「VTRS」(18.4 円/錠) : 使用実績なし

・クラシエ柴朴湯エキス細粒 (30.4 円/g) : 使用実績僅少のため

【複数規格採用中止】

・アゼルニジピン錠 16 mg「日医工」(13.3 円/錠) : 8 mg錠は採用継続

・アルファカルシドール錠 1.0 μ g「アメル」(6.1 円/錠): 0.25 μ g 錠、0.5 μ g 錠は採用継続

・注射用エンドキサン100mg (304.0 円/瓶) : 500 mg瓶は採用継続

・オキシドン徐放錠40mgNX「第一三共」(575.1 円/錠) : 5 mg錠、10 mg錠、20 mg錠は採用継続

・オルケディア錠2mg (398.9 円/錠) : 1 mgは採用継続

・ガランタミンOD錠4mg「サワイ」(24.2 円/錠) : 8 mg錠は採用継続

・グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 120mL (166.5 円/本) : 60mlは採用継続

・ソル・メドロール静注用1000mg (3186.0 円/瓶) : 40 mg、125 mg、500 mgは採用継続

・タケキャブ錠10mg (100.5 円/錠)

・テルミサルタン錠80mg「杏林」(14.7 円/錠) : 20 mg錠、40 mg錠は採用継続

・ヒルナミン錠(25mg) (5.7 円/錠) : 5 mg錠は採用継続

・フリバス錠50mg (50.6 円/錠) : 25 mg錠は採用継続

・モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」(1371.0 円/菅) : 10 mg菅は採用継続

4. 添付文書改訂

キイトルーダ点滴静注 100mg (一般名:ペムブロリズマブ)

4. 効能効果 追加

再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型 B 細胞リンパ腫

フルオロウラシル注 250mg,1000mg「トーワ」(先発名:5-FU)

4. 効能効果 追加

レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

テイコプラニン点滴静注用 200mg,400mg「日医工」(先発名:タゴシット)

11. 副作用 頻度不明に汎血球減少 追加

トリアゾラム錠 0.125mg,0.25mg「テバ」(先発名:ハルシオン)

禁忌 エンシトレビルフマル酸(ゾコーバ) 追加

リバロ錠 1mg,2mg,4mg,OD 錠 1mg,2mg,4mg (一般名:ピタバスタチン)

9. 特定の背景を有する患者に関する注意 追加

9.1.2 重症筋無力症又はその既往歴のある患者

重症筋無力症(眼筋型、全身型)が悪化又は再発することがある。(11.1.7 参照)

11. 副作用 追加

11.1.7 重症筋無力症(頻度不明)

重症筋無力症(眼筋型、全身型)が発症又は悪化することがある。(9.1.2 参照)

5. 添付資料

院内採用薬の供給停止・出荷調整薬について(2023年7月22日更新)

医薬品・医療機器等安全性情報 No.402

医療安全情報 No.200 「腹腔鏡の曇り止め用の湯による熱傷」

DSU No318

DPP-4 阻害薬による類天疱瘡への適切な処置について

レニン-アンジオテンシン系阻害作用を有する医薬品の胎児等への影響と注意事項について