

【概要】

1. 新規採用薬 : 該当なし
外来限定採用 : バファリン配合錠 A81 / ゾルトファイ / ソリクア
臨時採用(患者限定) : 該当なし
2. 供給状況
3. 採用変更
4. 添付文書改訂
5. 添付資料

1. 新規採用

①院内採用

該当なし

②外来患者限定採用

抗血小板剤

バファリン配合錠 A81 5.70 円/錠

【診療科名】 糖尿病内科

【申請医師名】 竹宮聖一

【申請理由】

「バファリン」を前医より継続のため

【組成】アスピリン 81mg、ダイアルミネート(ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート 11mg 及び炭酸マグネシウム 22mg)33mg

【効能効果】

・下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症(慢性安定狭心症、不安定狭心症) / 心筋梗塞 / 虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作(TIA)、脳梗塞)

・冠動脈バイパス術(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後における血栓・塞栓形成の抑制

・川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)

持効型溶解インスリンアナログ/ヒト GLP-1 アナログ 配合注射液

ゾルトファイ注フレックスタッチ 4847 円/キット

【診療科名】 糖尿病内科

【申請医師名】 稲田遼吾

【申請理由】 トルリシティなど週 1GLP1 薬の流通不安定に伴い必要患者が増えているため

【組成】 インスリン デグルデク(遺伝子組換え)、リラゲルチド(遺伝子組換え)

【効能又は効果】 インスリン療法が適応となる 2 型糖尿病

持効型溶解インスリンアナログ製剤/GLP-1 受容体作動薬

ソリクア配合注ソロスター 5506 円/キット

【診療科名】 糖尿病内科

【申請医師名】 稲田遼吾

【申請理由】 トルリシティなど週 1GLP1 薬の流通不安定に伴い必要患者が増えているため

【組成】 日局インスリン グラルギン(遺伝子組換え)、リキシセナチド

【効能又は効果】 インスリン療法が適応となる 2 型糖尿病

③臨時採用(患者限定)

該当なし

2. 供給

●出荷調整

- ・ウルソデオキシコール酸錠 100mg「JG」: 他社品の影響で出荷量減少、限定出荷
- ・沈降炭酸カルシウム錠 500 mg「NIG」: 需要過多の為出荷調整

3. 採用変更

①内服

【後発メーカー変更】

- ・アムロジピン OD 錠 2.5mg・5mg「ファイザー」 → 「VTRS」: 販売移管するため
- ・プレガバリン OD 錠 25mg・75mg「ファイザー」 → 「VTRS」: 販売移管するため
- ・ドキサゾシン錠 1mg・2 mg「ファイザー」 → 「VTRS」: 販売移管するため

②注射

- ・ヒアルロン酸 Na 関節注 25mgシリンジ「テバ」(292 円/菅) → アルツディスポ関節注 25mg(780 円/菅)

③外用

【後発メーカー変更】

- ・ポビドンヨードガーグル液 7%「日医工」30mL×50 本(2 円/mL) → 「ケンエー」30mL×10 本(3.2 円/mL)

④院内採用終了(在庫消尽次第採用終了)

- ・アスベリンドライシロップ 2% : 使用歴ないため。
- ・アレピアチン錠 100 mg : 年間使用極少、第一選択として用いられないため。
- ・アレピアチン注 250 mg : 年間使用なし。第一選択として用いられないため。
- ・イソバイドシロップ 70%分包 : 過去に破棄歴あり。
- ・イフェンプロジル錠 10mg「日医工」: 院内開始した経験ないため。
- ・ゾーミック錠 2.5 mg : 同効薬にスマトリプタンがある為院外限定へ。
- ・ソランターール錠 100mg : 年間使用 2 名。塩基性抗炎症薬であるがセレコキシブで代用可能のため。
- ・テタノブリン IH 静注 250 単位 : 年間使用なし。同種予防薬として破傷風混合トキソイドがあるため。
- ・ピペリデン塩酸塩錠 1 mg「ヨシトミ」: 同種同効採用アーテン錠。出荷状況に影響があるため終了。
- ・ロキシーン注 2 mg : 使用量極少のため。(57 円/管)
- ・クラシエ乙字湯エキス顆粒細粒 : 年間使用無しのため。
- ・クラシエ柴胡桂枝湯エキス顆粒 : 年間使用無しのため。
- ・ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 : 年間使用無しのため。
- ・ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 : 年間使用 5 名。
- ・ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 : 年間使用 2 名。

4. 添付文書改訂

ソタロール塩酸塩錠 40mg,80mg「TE」(先発名:ソタコール)

●併用禁忌薬剤追加

- ・シボニモド フマル酸 :シボニモド フマル酸の投与により心拍数が減少するため、併用により不整脈を増強するおそれがある。
- ・ラスクフロキサシン塩酸塩(注射) :相加的にQT延長作用を増強させる

リツキサン点滴静注 100mg,500mg (一般名:リツキシマブ)

●適応追加

既存治療で効果不十分なループス腎炎

プラザキサカプセル 75mg,110mg (一般名:ダビガトラン)

●8.重要な基本的注意 追加

8.13 本剤が食道に滞留した場合、食道潰瘍及び食道炎があらわれるおそれがあるので、以下の点を患者に指導すること。(11.1.5 参照)

- ・本剤を速やかに胃に到達させるため、十分量(コップ1杯程度)の水とともに本剤を服用すること。
- ・食道疾患の症状(嚥下困難又は嚥下痛、胸骨後部の痛み、高度の持続する胸やけ等)があらわれた場合には、担当医に相談すること。

●11.副作用 追加

11.1 重大な副作用

11.1.5 食道潰瘍(頻度不明)、食道炎(頻度不明)

エンハーツ点滴静注用 100mg (一般名:トラスツズマブ デルクステカン)

●4.効能又は効果 追加

がん化学療法後に増悪したHER2(ERBB2)遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

ジャカビ錠 5mg,10mg (一般名:ルキシリチニブリン酸塩)

●4.効能又は効果 追加

造血幹細胞移植後の移植片対宿主病(ステロイド剤の投与で効果不十分な場合)

5. 添付資料

院内採用薬の供給停止・出荷調整薬について(2023年9月16日更新)

医療安全情報 No.202 「バッグ型キット製剤の隔壁の未開通」

DSU No320