

【概要】

1. 新規採用薬 : アニユイティ  
外来限定採用 : 桂枝加芍薬大黃湯 / ノボリン R / フィアスプ  
臨時採用(患者限定) : イストダックス
2. 供給
3. 採用変更
4. 添付文書改訂
5. 添付資料

1. 新規採用

①院内採用

吸入ステロイド喘息治療剤

**アニユイティ 100 $\mu$ g エリプタ 30 吸入用 1471.5 円/キット**

【申請者】 薬剤部 DI 室

【申請理由】 ICS 製剤採用デバイス、ディスクスからエリプタへ変更するため

【組成】 フルチカゾンフランカルボン酸エステル

【効能効果】 気管支喘息

【用法用量】 1 日 1 回吸入投与

②外来患者限定採用

漢方製剤

**ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒 9.60/g**

【診療科名】 内科 【申請医師名】 竹宮聖一

【申請理由】 便秘にて大建中湯よりの切り替え

【組成】 本品 7.5g 中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス 4.0g を含有する。

日局シャクヤク 6.0g 日局ケイヒ 4.0g 日局タイソウ 4.0g

日局カンゾウ 2.0g 日局ダイオウ 2.0g 日局ショウキョウ 1.0g

【効能効果】

比較的体力のない人で、腹部膨満し、腸内の停滞感あるいは腹痛などを伴うものの次の諸症  
急性腸炎、大腸カタル、常習便秘、宿便、しぶり腹

生合成ヒト中性インスリン注射液

**ノボリン R 注フレックスペン 1,427/キット**

【診療科名】 糖尿病内科 【申請医師名】 竹宮聖一

【申請理由】 MK 術後、Q より R の方が望ましいため

【組成】 日局 インスリン ヒト(遺伝子組換え) 300 単位

【効能効果】 インスリン療法が適応となる糖尿病

## 超速効型インスリンアナログ注射液

フィアスプ注フレックスタッチ 1,737/キット

【診療科名】 糖尿病内科 【申請医師名】 竹宮聖一

【申請理由】 インスリン依存 T1DM で食事量不安定 faster insulin 希望

【組成】 日局インスリン アスパルト(遺伝子組換え) 300 単位

【効能効果】 インスリン療法が適応となる糖尿病

### ③臨時採用(患者限定)

抗悪性腫瘍剤 ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤

イストダックス点滴静注用 10mg 111,785 円/瓶

【診療科名】 血液内科 【申請医師名】 遅塚明貴

【申請理由】

2019 年 9 月診断 CHOP 後再発

ムンデシン、GCD、ベンダムスチン、ハイアスタ、アドセトリス、ポテリジオ全て抵抗性のため

【組成】ロミデプシン 11mg

【禁忌】 2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性[9.5 参照]

【効能効果】 再発又は難治性の末梢性 T 細胞リンパ腫

【用法用量】 ロミデプシンとして 14mg/m<sup>2</sup>(体表面積)を 1、8、15 日目に 4 時間かけて点滴静注した後、休薬(16～28 日目)する。この 28 日間を 1 サイクルとして投与を繰り返す。

## 2. 供給

### ●出荷調整

・該当なし

## 3. 採用変更 ※在庫消尽次第切り替え

### ①内服

【後発品から後発品への変更】

・エゼチミブ錠 10mg「サワイ」 → 「ニプロ」

・フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg「トーワ」 → フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg「ダイト」

### ②注射

・イーケプラ点滴静注 500 mg(1484 円/瓶) → レベチラセタム点滴静注 500 mg「日新」(731 円/瓶)

【後発品から後発品への変更】

・ニトログリセリン点滴静注 50mg/100mL「HK」 → 「TE」

### ③外用

該当なし

【後発品から後発品への変更】

・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「NIG」 → 「イワキ」

・尿素クリーム 20%「フジナガ」 → 「SUN」

#### ④院内採用終了（在庫消尽次第採用終了）

##### 【内服】

- ・アプリンジン塩酸塩カプセル 10 mg「NP」（13.4 円/錠）
- ・イトプリド塩酸塩錠 50 mg「タナベ」（6.5 円/錠）
- ・エクセラーゼ配合錠（5.7 円/錠）：2024/3/31 経過措置のため
- ・カナグル錠 100 mg(168.8 円/錠)：ジャディアンス錠・スーグラ錠で対応可能。糖尿病内科確認済
- ・クレンブテロール錠 10 mg「ハラサワ」(5.8 円/錠)：年間使用 0。β 刺激第三世代としてメプチンで対応可。
- ・ブレディニン錠 50（124.9 円/錠）：使用歴なし。一旦採用終了。
- ・ベポタスチンベシル酸塩錠 10 mg「タナベ」(12.5 円/錠)：抗アレルギー薬当院多数採用のため
- ・ラグノス NF 経口ゼリー分包 12g(42.5 円/包)：ラクツロースシロップで対応可能
- ・流動パラフィン：院内製剤採用終了のため

##### 【注射】

- ・アクチバシン注 2400 万(157831 円/瓶)：600 万・1200 万で対応 脳外確認済
- ・サイビスクディス関節注 2mL（9329 円/本）：納品不可。使用実績なしのため削除。
- ・ダルベポエチナルファ BS 注射液 180 μg(10589 円/筒)：多規格採用。破棄数多いため削除。
- ・メキシチール点滴静注 125 mg（524 円/菅）：使用歴なし、リドカインで代替可。循環器確認済

##### 【外用】

- ・テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「イワキ」(10.5 円/g)
- ・フルタイド 100 ディスカス（1265.6 円/キット）：使用少ない。アニュイティ 100 を代わりに採用
- ・ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」（9 円/g）：他規格で対応
- ・ランタス XR 注ソロスター(2251 円/キット)：インスリンラルギン・トシハで対応可能。糖尿病内科確認済

#### 4. 添付文書改訂

##### リツキシマブ BS 点滴静注 100mg,500mg「ファイザー」（先発名：リツキサン）

- 4.効能又は効果 下記追加  
既存治療で効果不十分なループス腎炎

##### イクスタンジ錠 40mg,80mg（一般名：エンザルタミド）

- 2.禁忌(次の患者には投与しないこと) 追加  
2.2 ドラビリンあるいはエンシトレルビル フマル酸を投与中の患者(10.1 参照)

##### テオフィリン徐放錠 50mg,100mg,200mg「日医工」（商品名：テオドール）

- 禁忌 追加  
2. 12 時間以内にアデノシン(アデノスキャン)を使用する患者(「相互作用」の項参照)

##### アブストラル舌下錠 100 μg,200 μg,400 μg（一般名：フェンタニルクエン酸塩）

##### フェンタニル注射液 0.1mg,0.25mg「第一三共」

##### フェントステープ 0.5mg,1mg,2mg,4mg,6mg,8mg

- 13.過量投与 下線部追加  
13.1 症状 薬理作用の増強により重篤な換気低下を示す。また、フェンタニルの過量投与により白質脳症が認められている。

**デエピゴ錠 2.5mg,5mg,10mg (一般名:レンボキサント)**

●9.特定の背景を有する患者に関する注意 追加

9.6 授乳婦 治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。健康成人に 10mg を経口投与した時に母乳中へ移行することが認められており、相対的乳児投与量 (RID)は 2%未満であった。

**5. 添付資料**

院内採用薬の供給停止・出荷調整薬について(2023年11月21日更新)

医薬品・医療機器等安全性情報 No.405

医療安全情報 No.204 「人工呼吸器の吸気側と呼気側の回路接続間違い」

DSU No.321

メキシチール点滴静注代替薬