

メキシチール点滴静注 125mg の代替候補品(代替となりうる製品)

下記のいずれの薬剤も、メキシチール点滴静注 125mg とは、有効成分ならびに有効性や安全性のプロファイルが異なりますので、あくまでも処方医のご判断によってご使用いただく(代替としていただく)ようお願いいたします。メキシチール点滴静注 125mg が有効で、かつ内服可能な場合には、メキシチールカプセル 50mg/100mg にお切り替えいただくことも可能と考えられます。(「頻脈性不整脈(心室性)」の効能・効果は同一です)

メキシチールと薬剤分類情報(不整脈薬物治療に関するガイドライン 2009 による)がほぼ同じ薬剤

リドカイン塩酸塩 製剤

販売名	会社名	規格単位	薬価	効能・効果	主な用法・用量(一部抜粋)
静注用キシロカイン2%	アストラゼネカ	2% 5mL 1 管	94	期外収縮(心室性、上室性)、発作性頻拍(心室性、上室性)、急性心筋梗塞時及び手術に伴う心室性不整脈の予防	通常、成人 1 回 50~100mg を緩徐に静脈内注射する。
オリベス静注用2%	高田製薬	2% 5mL 1 管	92		
オリベス点滴用1%	高田製薬	1% 200mL 1 袋	579		通常、1 分間に 1~2mg の速度で静脈内注射する。
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	テルモ	2% 5mL 1 筒	173	期外収縮(心室性、上室性)、発作性頻拍(心室性、上室性)、急性心筋梗塞時及び手術に伴う心室性不整脈の予防	通常、成人 1 回 50~100mg を緩徐に静脈内注射する。