DI ニュース 2 月号 2024.2.28 発行

明理会中央総合病院
薬剤部　DI 室

【概要】
1. 新規採用薬　：タシグナ規格追加
　外来限定採用 ：エタネルセプト / シンポニー / プロペト / アレックスビー
　臨時採用(患者限定)：該当なし
2. 供給
3. 採用変更
4. 添付文書改訂
5. 添付資料

1. 新規採用

①院内採用

＊剤形追加採用

・タシグナカプセル 150mg(3,656.0 円/錠)追加採用:タシグナカプセル 200 mg(4815.9 円/錠)既に採用済。患者負担踏まえ 2 規格採用。

②外来患者限定採用

完全ヒト型可溶性 TNFα/LTαレセプター製剤

エタネルセプト BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「MA」　12,722 円/筒

【診療科名】整形外科　【申請医師名】長島賢二
【申請理由】リウマチ→腎障害ありMTX 使用不可のため
【組成】　エタネルセプト(遺伝子組換え)
【効能効果】既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)

ヒト型抗ヒト TNFαモノクローナル抗体製剤

シンポニー皮下注 50mg オートインジェクター　109,382 円/キット

【診療科名】整形外科　【申請医師名】長島賢二
【申請理由】リウマチ→腎障害ありMTX 使用不可のため
【組成】　ゴリムマブ(遺伝子組換え)50mg 含有
【効能効果】
〇既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)
〇中等症から重症の潰瘍性大腸炎の改善及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)

眼科用・一般軟膏基剤

プロペト　24.00 円/10g

【診療科名】皮膚科　【申請医師名】佐々木裕子
【申請理由】白色ワセリンと比べプロペトは眼周囲への外用が可能であるため
【組成】　日局白色ワセリン 1g
【効能効果】眼科用軟膏基剤、一般軟膏基剤として調剤に用いる。また、皮膚保護剤として用いる。

ウイルスワクチン類

アレックスビー筋注用

【診療科名】 内科　　【申請医師名】 中嶌賢尚

【申請理由】 RS ウイルスの感染予防目的で使用します

【組成】　　RS ウイルス PreF3 抗原 120μg

【効能効果】 RS ウイルスによる感染症の予防

③臨時採用(患者限定)

該当なし

2.　供給

●出荷調整

・アズノール軟膏 0.033%　:能登半島地震の影響。資材製造所が被災。資材供給安定するまで限定出荷。

・アスパラ CA 錠　　:能登半島地震の影響。製造用水取水困難に伴い製造一時中止。

・ウロカルン錠 225 mg　:限定出荷。原薬(ウラジロガシエキス)の原料であるウラジロガシの葉に関し、2023 年の降水量不足等の天候不順要因と推測される生育不良および採取量不足により、本製品の安定供給に必要なウラジロガシの葉を確保することができなかった。

●販売中止

・ボグリボース錠 0.2 mg/0.3 mg「トーワ」

　:安定供給考慮し、OD 錠のみに製造集約するため在庫消尽次第販売終了

3.　採用変更　※在庫消尽次第切り替え

①内服

・ザイザル錠 5 mg(57.2 円/錠) → レボセチリジン錠 5mg「フェルゼン」(18.80 円/錠) :院外採用

・ボグリボース錠 0.2 mg「トーワ」 → ボグリボース OD 錠 0.2 mg「トーワ」

・ボグリボース錠 0.3 mg「トーワ」 → ボグリボース OD 錠 0.3 mg「トーワ」

【後発から後発へ変更】

・ダサチニブ錠 20mg「NK」 → 「BMSH」 :流通の影響に伴う変更

・ダサチニブ錠 50mg「NK」 → 「BMSH」 :流通の影響に伴う変更

②注射

【後発から後発へ変更】

・ナファモスタット注射用 50mg「SW」(341 円/瓶) → 「NIG」(650 円/瓶) 出荷調整に伴う一時的な変更

③外用

・ゲーベンクリーム 1%(12.8g/円) :100g/個包装 → 50g/本 包装単位の変更

④院内採用終了 (在庫消尽次第採用終了)

該当なし

4.　添付文書改訂

エンレスト錠 50mg,100mg,200mg （一般名：サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物）

●4.効能又は効果　追加

小児　慢性心不全

オプジーボ点滴静注 20mg,100mg,120mg,240mg （一般名：ニボルマブ）

●4.効能又は効果　追加

根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍

ジャディアンス錠 10mg （一般名：エンパグリフロジン） ※25 mg錠は適応なし

●4.効能又は効果　追加

慢性腎臓病　ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。

注射用エンドキサン 100mg,500mg （一般名：シクロフォスファミド）

●4.効能又は効果　追加

造血幹細胞移植における移植片対宿主病の抑制

サイラムザ点滴静注液 100mg,500mg （一般名：ラムシルマブ）

ザルトラップ点滴静注 100mg,200mg （一般名：アフリベルセプト ベータ）

●11.1　重大な副作用　追加

11.1.15　動脈解離（頻度不明注 1)、頻度不明注 2))

大動脈解離を含む動脈解離があらわれることがある。

アルファカルシドールカプセル 0.25μg,0.5μg,1.0μg,3μg「BMD」（商品名：アルファロール）

●10.2　併用注意（併用に注意すること）　追加

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
マグネシウムを含有する製剤 酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム等	高マグネシウム血症が起きたとの報告がある。	*他のビタミン D 誘導体と同様に腸管でのマグネシウムの吸収を促進させると考えられる。*
	ミルク・アルカリ症候群（高カルシウム血症、高窒素血症、アルカローシス等）があらわれるおそれがある。	*血中マグネシウムの増加により代謝性アルカローシスが持続するため、尿細管でのカルシウム再吸収が増加する。*
PTH 製剤 テリパラチド*等* *PTHrP 製剤* *アバロパラチド酢酸塩* （8.1-8.3 参照）	高カルシウム血症があらわれるおそれがある。	相加作用による。

ビ・シフロール錠 0.125mg,0.5mg （一般名：プラミペキソール）

●11.2　その他の副作用　追加

中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群（下肢静止不能症候群）

ダサチニブ錠 20mg,50mg「NK」（商品名：スプリセル）

●4.効能又は効果　追加

慢性骨髄性白血病

セルトラリン錠 25mg,50mg,100mg「JG」（商品名：ジェイゾロフト）
●8.重要な基本的注意　追加
＜効能共通＞
8.7 血小板減少があらわれることがあるので、投与期間中は血液検査を行うこと。（11.1.9 参照）
●11.副作用　追加
11.1 重大な副作用
11.1.9 血小板減少（頻度不明）

5. 添付資料
院内採用薬の供給停止・出荷調整薬について(2024 年 2 月日更新)
医療安全情報 No.207 「ACE 阻害薬服用患者に禁忌の血液浄化器の使用」
医薬品・医療機器等安全性情報 No.407