

セフトリアキソンとの配合変化

配合可能な薬

《セフトリアキシソンの投与時間が1時間半以内の場合》

生理食塩液・5%ブドウ糖液・ジルチアゼム・ソルコーテフ
ソルデム1・ソルデム3A・ドパミン・ハンプ・フロセミド・ミルリノン

配合不可な薬

エルネオパ・ソルアセトF・ソルラクトS
ニカルジピン・ドブタミン・ハイカリックRF
ビーフリード・フィジオ140・ラクテック



Caイオンを含有する注射剤
又は輸液との配合により混濁する
ため、組成を確認してみてください
組成は輸液バッグに直接記載が
あります！

メロペナムとの配合変化

配合可能な薬

《メロペナムの投与時間が1時間半以内の場合》


生理食塩液・5%ブドウ糖液・10%ブドウ糖液・20%ブドウ糖液

アシクロビル・アミノフィリン・イノバン・エルネオパ・グルタチオン

ゲンタシン・ソルデム1・ソルデム3A・ドパミン・ドブタミン

ニトロール注・バンコマイシン・ビーフリード・フィジオ140


フロセミド・ヘパリンNa・マンニトールS・メイロン・ラクテック



配合不可な薬

50%ブドウ糖液・アミルレバン・アミパレン・キドミン・シプロフロキサシン

ソルラクトS・ブロムヘキシシン・ニカルジピン



ニカルジピンとの配合変化

配合不可な薬が多いので、基本的に生理食塩液or5%ブドウ糖液で希釈し単独投与にしてください

配合可能な薬

生理食塩液・5%ブドウ糖液・ソルデム 1
ハイカリックRF・ビーフリード

配合不可な薬

アスコルビン酸・アミノフィリン・アミルレバン・アミパレン
カルバゾクロムスルホン酸Na・カンレノ酸カリウム・キシロカイン
キドミン・グルタチオン・ソルアセトF・ソルデム3A・ソルラクトS
セフォチアム・セフメタゾール・トラネキサム酸・フィジオ140・フロセミド
ヘパリンNa・ホスホマイシンNa・メイロン・ラクテック・リドカイン



単独投与すべき薬

アルプロスタジル
グロブリン製剤
ダントリウム
ハンプ
プロタミン
メイロン
ラボナール

イントラリポス
ケイツーN
ドブタミン
フェジン
プロポフォール
ミルリノン
レペタン

