

薬事委員会からのお知らせ

1. 新規採用

血圧降下薬（院外限定採用）

新規採用薬品
ミネプロ錠 2.5mg(第一三共) 薬価：91.60 円 / 2.5mg1錠

【組成】 エサキセレノン錠

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 高カリウム血症の患者もしくは本剤投与開始時に血清カリウム値が 5.0mEq/L を超えている患者[高カリウム血症を増悪させるおそれがある。]
3. 重度の腎機能障害(eGFR 30mL/min/1.73m² 未満)のある患者[9.2.1 参照]
4. カリウム保持性利尿剤(スピロノラクトン、トリアムテレン、カンレノ酸カリウム)、アルドステロン拮抗剤(エプレレノン)又はカリウム製剤(塩化カリウム、グルコン酸カリウム、アスパラギン酸カリウム、ヨウ化カリウム、酢酸カリウム)を投与中の患者[10.1 参照]

【効能・効果】

高血圧症

【用法・用量】

通常、成人にはエサキセレノンとして 2.5mg を 1 日 1 回経口投与する。なお、効果不十分な場合は、5mg まで增量することができる。

頭痛薬

新規採用薬品
イミグラン注 3(GSK) 薬価：3,023 円 / 3mg1mL1管

【組成】 スマトリプタンコハク酸塩

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 心筋梗塞の既往歴のある患者、虚血性心疾患又はその症状・兆候のある患者、異型狭心症(冠動脈攣縮)のある患者[不整脈、狭心症、心筋梗塞を含む重篤な虚血性心疾患様症状があらわれることがある]
3. 脳血管障害や一過性脳虚血性発作の既往のある患者[脳血管障害や一過性脳虚血性発作があらわれることがある]
4. 末梢血管障害を有する患者[症状を悪化させる可能性が考えられる]
5. コントロールされていない高血圧症の患者[一過性の血圧上昇を引き起こすことがある]
6. 重篤な肝機能障害を有する患者[本剤は主に肝臓で代謝されるので、重篤な肝機能障害患者では血中濃度が上昇するおそれがある]
7. エルゴタミン、エルゴタミン誘導体含有製剤、あるいは他の 5-HT1B/1D 受容体作動薬を投与中の患者[「相互作用」の項参照]
8. モノアミンオキシダーゼ阻害剤(MAO 阻害剤)を投与中、あるいは投与中止 2 週間以内の患者[「相互作用」の項参照]

【効能・効果】

片頭痛、群発頭痛

【用法・用量】

片頭痛及び群発頭痛発作の頭痛発現時に、通常、成人にはスマトリプタンとして 1 回 3mg を皮下投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

ただし、1 回 3mg、1 日 6mg を超えないこと。

<片頭痛>

1 回の頭痛発作において、初回投与で頭痛が軽減した場合には、24 時間以内に起った次の発作に対して追加投与ができるが、2 回の投与の間には少なくとも 1 時間の間隔をおくこと。

<群発頭痛>

1 日 2 回の発作に投与することができるが、2 回の投与の間には少なくとも 1 時間の間隔をおくこと。

HIF-PH 阻害薬・腎性貧血治療薬（院内限定採用）

新規採用薬品

エベレンゾ錠 20mg・50mg・100mg（アステラス）

薬価:375.40 円 / 20mg

793.90 円 / 50mg

1,399.00 円 / 100mg

【組成】 ロキサデュstatt錠

【警告】

本剤投与中に、脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓等の重篤な血栓塞栓症があらわれ、死亡に至るおそれがある。本剤の投与開始前に、脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓等の合併症及び既往歴の有無等を含めた血栓塞栓症のリスクを評価した上で、本剤の投与の可否を慎重に判断すること。また、本剤投与中は、患者の状態を十分に観察し、血栓塞栓症が疑われる徴候や症状の発現に注意すること。血栓塞栓症が疑われる症状があらわれた場合には、速やかに医療機関を受診するよう患者を指導すること。

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 妊婦又は妊娠している可能性のある女性

【効能・効果】

透析施行中の腎性貧血

【用法・用量】

赤血球造血刺激因子製剤で未治療の場合

通常、成人には、ロキサデュstattとして1回50mgを開始用量とし、週3回経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1回3.0mg/kgを超えないこととする。

赤血球造血刺激因子製剤から切り替える場合

通常、成人には、ロキサデュstattとして1回70mg又は100mgを開始用量とし、週3回経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1回3.0mg/kgを超えないこととする。

2. 採用変更薬剤一覧 注:【般】の記載がある場合には外来は一般名処方とする

消化性潰瘍用薬

【般】アズクレニン S 配合顆粒 → マーズレン S 配合顆粒

薬価:6.50 円

薬価:13.40 円

販売中止のため

合成抗菌薬

リネゾリド注射液 600mg「サワイ」 → リネゾリド点滴静注 600mg/300mL「HK」

薬価(同一):7,730 円/600mg300mL1 袋

製品回収のため

制癌薬

【般】タモキシフェン錠 20mg「MYL」 → タモキシフェン錠 20mg「DSEP」

薬価:140.40 円

薬価:49.80 円

鎮吐薬

【般】メトクロプラミド錠 5mg「テバ」 → メトクロプラミド錠 5mg「トーワ」

薬価(同一):5.70 円

出荷調整のため

アレルギー性疾患治療剤

【般】アイピーディカプセル 100 → スプラタストシル酸塩カプセル 100mg「サワイ」

薬価:33.30 円

薬価:21.90 円

販売中止のため

抗てんかん薬

ビムパット点滴静注 200mg → ビムパット点滴静注 100mg

薬価:4,320 円

薬価:2,459 円

規格変更

急性循環不全改善剤

塩酸ドパミン注キット 200/600 → ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg/600mg バッグ「武田テバ」
薬価:307 円 / 0.1%200mL 515 円 / 0.3%200mL 薬価:845 円 / 0.1%200mL1 袋 1,233 円 / 0.3%200mL1 袋
製品回収のため

抗ヘルペスウイルス薬

アシクロビル点滴静注液 250mg バッグ 100mL「アイロム」 → アシクロビル点滴静注液 250mg「日医工」
薬価:779 円 / 250mg100mL1 袋 薬価: 478 円 / 250mg1 管
製品回収のため

鎮吐薬

グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ「アイロム」 → グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」
薬価:1,130 円 / 3mg100mL1 袋 薬価:1,625 円 / 3mg100mL1 袋
製品回収のため

3. 採用中止薬品一覧

外用殺菌消毒薬

ヨードホルムガーゼ
期限切れのため

血圧降下薬、狭心症治療薬（院外限定採用）

セレクトール錠 100mg
期限切れのため

4. その他

酸化マグネシウム製剤 適正使用に関するお願い—高マグネシウム血症—

DSU No.291
医療安全情報 No.164,165