

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| レジメン名 3wDTX (術前・術後) | 診療科 乳腺外科 |
|----------------------------------|--------------------|

| |
|--------------------------|
| 適応疾患 乳癌（術前・術後） |
|--------------------------|

| | |
|------|-------------|
| 1クール | 3週間 |
| 総クール | 4クール |
| 休薬期間 | 20日間 |

| 薬剤名（一般名） | 投与量 (mg/m ²) | 投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入) |
|----------|--------------------------|-----------------------|
| ドセタキセル | 75mg/m ² | d 1 |
| | | |

| 内服併用薬 | 投与量 | 用法 | 投与日 (d1~d5、d1、d8等) |
|-------|-------|---------|--------------------|
| デカドロン | 8mg/日 | 分2 朝夕食後 | d 1 夕より2日間 |
| | | | |

処方（輸液・プレメジ・ポストメジを含む）

| 番号 | 薬剤名・用量 (mg/m ²) | 投与方法 | 投与速度 | 投与日 □(d1~5等) |
|----|--------------------------------------|------|------|--------------|
| ① | グラニセトン3mgバッグ 100mL+ドセタキセル 8mg | DIV | 30分 | d 1 |
| ② | ドセタキセル 75mg/m ² +Ns 250mL | DIV | 60分 | d 1 |
| ③ | Ns 50mL (フラッシュ用) | DIV | 15分 | d 1 |
| | | | | |

備考（減量・中止の基準を記載してください）