

レジメン名	診療科
PER+HER+DTX	乳腺外科

適応疾患
進行・再発乳癌

1クール	21日
総クール	奏功中継続
休薬期間	20日

薬剤名（一般名）	投与量	投与日（d1～d5、d1、d8等で記入）
ペルツズマブ	840mg/body	d 1（初回のみ）
ペルツズマブ	420mg/body	d 1（2クール目以降）
トラスツズマブ	8mg/kg	d 1（初回のみ）
トラスツズマブ	6mg/kg	d 1（2クール目以降）
ドセタキセル	75mg/m ²	d 1

内服併用薬	投与量	用法	投与日（d1～d5、d1、d8等）
デカドロン	8mg/日	分1	d 1、2

処方（輸液・プレメジ・ポストメジを含む）

番号	薬剤名・用量（mg/m ² ）	投与方法	投与速度	投与日（d1～5等）
①	パージェタ（840or420）mg+Ns 250mL	DIV/CV	60分（*）	d 1
②	トラスツズマブ（8or6）mg/kg+Ns 250mL	DIV/CV	90分（*）	d 1
③	ゲラセトロン3mgハック 100mL+デキサート 8mg	DIV/CV	30分	d 1
④	ドセタキセル 75mg/m ² +Ns 250mL	DIV/CV	60分	d 1
⑤	Ns 50mL（フラッシュ用）	DIV/CV	10分	d 1
⑥				
⑦	（*）2回目以降は投与時間30分に短縮可			
⑧				

備考（減量・中止の基準を記載してください）

PER, HERは減量しない。DTXは単独使用時の減量基準に準ずる。