

レジメン名	診療科
PER+HER+PTX	乳腺外科

適応疾患
転移再発乳癌

1クール	21日
総クール	奏功中継続
休薬期間	6日

薬剤名（一般名）	投与量	投与日（d1～d5、d1、d8等で記入）
ペルツズマブ	840mg/body	d1（初回のみ）
ペルツズマブ	420mg/body	d1（2クール目以降）
トラスツズマブ	8mg/kg	d1（初回のみ）
トラスツズマブ	6mg/kg	d1（2クール目以降）
パクリタキセル	80mg/m ²	d1、d8、d15

処方（輸液・プレメジ・ポストメジを含む）

番号	薬剤名・用量 (mg/m ²)	投与方法	投与速度	投与日 (d1～5等)
①	パージェタ (840or420) mg+Ns 250mL	DIV	60分(*)	d1
②	ハーセプチン (8or6) mg/kg+Ns 250mL	DIV	60分(*)	d1
③	Ns 50mL+テキサト 8mg +ファモチジン 20mg+ネオレスタール 10mg	DIV	10分	d1、d8、d15
④	パクリタキセル 80mg/m ² +Ns 250mL	DIV	60分	d1、d8、d15
⑤	Ns 50mL(フラッシュ用)	DIV	10分	d1、d8、d15
⑥	(*) 2回目以降は投与時間30分に短縮可			

備考（減量・中止の基準を記載してください）

1日の投与だと時間がかかるために分割投与可能とする

トラスツズマブ、ペルツズマブは減量しない

G3以上の副作用を認めた場合G2以下に回復するまで治療延期

治療延期後パクリタキセルを60mg/m²に減量、さらに減量する場合は45mg/m²まで可