

レジメン名	診療科
カドサイラ	乳腺外科

適応疾患
進行・再発乳がん

1クール	21日間
総クール	奏功中継続
休薬期間	20日

薬剤名(一般名)	投与量(mg/m ²)	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
カドサイラ	3.6mg/kg	d1

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量(mg/m ²)	投与方法	投与速度	投与日 (d1~5等)
①	カドサイラ 3.6mg/kg + Ns 250mL	DIV/CV	90分	d1
	*2回目以降は投与時間を30分に短縮可			
②	Ns50mL (フラッシュ用)	DIV/CV	15分	d1

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

- ・初回投与時は90分かけて投与する。
- ・初回投与の忍容性が良好であれば2回目以降30分に短縮可
- ・減量の目安
1段階減量 3.0mg/kg 2段階減量 2.4mg/kg 3段階減量 投与中止
- ・LVEF (左室駆出率) 低下、AST/ALT増加、高ビリルビン血症、血小板減少
末梢神経障害により休薬、減量、中止あり
- ・0.2または0.22μmインラインフィルター (ホリエール社製) を通して投与する