

| | |
|---------|------|
| レジメン名 | 診療科 |
| Bev+PTX | 乳腺外科 |

| |
|---------------------------|
| 適応疾患 HER2陰性 転移・再発乳癌 |
|---------------------------|

| | |
|------|-----|
| 1クール | 28日 |
| 総クール | |
| 休薬期間 | 13日 |

| 薬剤名(一般名) | 投与量(mg/m ²) | 投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入) |
|----------|-------------------------|-----------------------|
| ベバシズマブ | 10mg/kg | d1、d15 |
| パクリタキセル | 90mg/m ² | d1、d8、d15 |
| | | |
| | | |
| | | |

| 内服併用薬 | 投与量(mg/m ²) | 用法 | 投与日(d1~d5、d1、d8等) |
|-------|-------------------------|-----------|-------------------|
| ポララミン | 6mg/日 | ケラセトロン開始時 | d1、d8、d15 |
| | | | |

処方 (輸液・プレレジ・ポストレジを含む)

| 番号 | 薬剤名・用量(mg/m ²) | 投与方法 | 投与速度 | 投与日(d1~5等) |
|----|--|------|----------------------------|------------|
| ① | ベバシズマブ10mg/kg + Ns100ml | DIV | 初回90分 2回目60分 3回目~30分 | d1、d15 |
| ② | デキサート8mg+ファモチジン20mg+ケラセトロン3mgハック 100mL | DIV | 30分 | d1、d8、d15 |
| ③ | パクリタキセル 90mg/m ² +Ns 250mL | DIV | 60分 | d1、d8、d15 |
| ④ | Ns 50mL(フラッシュ用) | DIV | 15分 | d1、d8、d15 |
| ⑤ | | | | |
| ⑥ | | | | |
| ⑦ | | | | |
| ⑧ | | | | |

・0.22μm以下のインラインフィルターを使用・DEHPフリー(又はPVCフリー)の輸液セットを使用
備考 (減量・中止の基準を記載してください)