

レジメン名	診療科
DDAC療法	乳腺外科

適応疾患
再発リスクの高い 術前・術後乳癌

1クール	14日
総クール	術前・術後 4クール
休薬期間	13日間

薬剤名(一般名)	投与量(mg/m ²)	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
ドキシルビシン	60mg/m ²	d1
シクロホスファミド	600mg/m ²	d1

内服併用薬	投与量	用法	投与日(d1~d5、d1、d8等)
アプレピタントCap	125mg	ハロセトン投与30分前	d1
アプレピタントCap	80mg	分1 朝食後	d2~d3
デカドロン	8mg/day	分2 朝昼食後	d2~d4

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量(mg/m ²)	投与方法	投与速度	投与日(d1~5等)
①	ハロセトン 0.75mg+デキサト 9.9mg/Ns 100ml	DIV	30分	d1
②	ドキシルビシン 60mg/m ² + Ns 50mL	DIV	15分	d1
③	エンドキサン 600mg/m ² + Ns 250mL	DIV	30分	d1
④	Ns 50mL (フラッシュ用)	DIV	15分	d1
⑤	ジアラスタ3.6mg/body (外来:ボディボット、入院:皮下注)	皮下		d1投与終了後 24時間以降
⑥				
⑦				
⑧				
⑨				
⑩				

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

- ・再発高リスク: リンパ節転移陽性やホルモン受容体陰性など