

レジメン名	診療科
PER+HER	乳腺外科

適応疾患
術後浸潤性乳癌 転移・再発乳癌

1クール	21日
総クール	術後浸潤性：術前を合わせて18回 転移・再発：PDまで
休薬期間	20日

薬剤名（一般名）	投与量	投与日（d1～d5、d1、d8等で記入）
ペルツズマブ	840mg/body	d1（初回のみ）
ペルツズマブ	420mg/body	d1（2クール目以降）
トラスツズマブ	8mg/kg	d1（初回のみ）
トラスツズマブ	6mg/kg	d1（2クール目以降）

内服併用薬	投与量	用法	投与日（d1～d5、d1、d8等）
なし			

処方（輸液・プレメジ・ポストメジを含む）

番号	薬剤名・用量(mg/m ²)	投与方法	投与速度	投与日（d1～5等）
①	パージェタ（840or420）mg+N _s 250mL	DIV/CV	初回60分 2回目～30分	d1
②	トラスツズマブ（8or6）mg/kg+N _s 250mL	DIV/CV	初回90分 2回目～30分	d1
③	N _s 50mL（フラッシュ用）	DIV/CV	15分	d1
④				
⑤				
⑥				
⑦				

備考（減量・中止の基準を記載してください）

PER, HERは減量しない

パージェタ適正使用ガイドより

- ・ 前回投与から6週間以内なら420mg、6週間以上なら840mgで投与する
- ・ ベースラインからのEF低下 $\geq 10\%$ 、EF40%未満で最低3週間投与延期
- ・ 毒性などにより2サイクルを超えて投与延期の場合は中止