

レジメン名	診療科
GC療法 (消化器)	内科

適応疾患
切除不能・再発胆道癌

1クール	21日間
総クール	PDまで
休薬期間	13日間

薬剤名(一般名)	投与量(mg/m ²)	投与日 (d1~d5、d1、d8等で記入)
ゲムシタビン	1000mg/m ²	d1, 8
シスプラチン	25mg/m ²	d1, 8

処方 (輸液・プレメジ・ポストメジを含む)

番号	薬剤名・用量(mg/m ²)	投与方法	投与速度	投与日 (d1~5等)
①	ソルデム3A500mL+硫酸Mg20mL	DIV	90分	d1, 8
②	アロキシ0.75mg+デキサート8mg+Ns50mL	DIV	30分	d1, 8
③	シスプラチン25mg/m ² +Ns500mL	DIV	120分	d1, 8
④	ゲムシタビン1000mg/m ² +Ns100mL	DIV	30分	d1, 8
⑤	Ns50mL(フラッシュ用)	DIV	15分	d1, 8
⑥				

備考 (減量・中止の基準を記載してください)

減量基準

grade4 (500未満) の好中球減少
 2万未満の血小板減少または血小板輸血実施
 基準値上限の10倍を超えるAST/ALT上昇
 基準値上限の1.5倍を超えるCr上昇

ゲムシタビン
 1000→800mg/m²
 1000→800mg/m²
 1000→800mg/m²
 変更なし

シスプラチン
 変更なし
 変更なし
 変更なし
 休薬